

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

کتاب طلایی آزمایش های شیمی

چگونه می توانیم آزمایشگاه خانگی برای انجام بیش از ۲۰۰ آزمایش ساده دایر کنیم

رابرت برنت

مترجم : زهرالحمدی (طنین)

با مقدمه : دکتر آرش باباخانیان

تقدیم به پدر و مادرم

کسانی که بعد از خدای متعال، بزرگ ترین حامیان زندگی ام هستند
و تقدیم به استادم ب چاوشی نژاد کسی که تپش قلب قلمم به ندای اوست

نهرت :

۷	پیشگفتار
۹	اهمیت شیمی
۱۱	گذشتگان شیمی
۱۶	وسایل آزمایشگاه
۱۸	برپا کردن آزمایشگاه خانگی
۲۰	وسایل مورد نیاز برای آزمایش ها
۲۴	اصول مهارت درست آزمایشگاه
۲۷	شمع آفای فارادی
۳۱	عناصر، ترکیبات، محلو ط
۳۳	آب، مهم ترین ترکیب
۳۴	الکترولیز آب
۳۶	اکسیژن، نفس زندگی
۳۸	هیدروژن، سبک تر از همه
۴۰	کربن دی اکسید
۴۲	نیتروژن
۴۴	آمونیاک
۴۵	کلر
۴۸	محضر نویسی شیمیابی
۵۱	جدول تناوبی عناصر
۵۲	راز محلول ها
۵۵	کار با اسیدها

کار با بازها	۵۷
نمک ها	۵۸
ید - بنفش یا قهوه ای	۶۱
گوگرد و ترکیباتش	۶۳
سولفید هیدروژن	۶۸
سیلیسیم	۷۰
بور-آینده موشک ها ، عنصری قوی	۷۳
سدیم و پتاسیم	۷۶
کلسیم، برای ساختن	۷۸
بیایید دو فلز را باهم مقایسه کنیم (روی و منیزیم).....	۸۰
آلومینیم.....	۸۲
منگنز ، فلز بسیاری از رنگ ها	۸۴
ما در عصر آهن زندگی می کنیم	۸۵
مس دیروز و امروز	۸۶
نقره ، فلزی باشکوه.....	۸۸
کربن ، عنصر یک میلیون ترکیب.....	۹۰
-هیدروکربن ها	۹۱
- کربوهیدرات ها	۹۳
- الکل ها	۹۶
- اسیدهای کربوکسیل	۹۷
تعاریفی که در شیمی استفاده می شود	۹۸
بزرگانی از شیمی	۱۰۱
پیوست - جدول تناوبی	۱۱۰

پیشگفتار:

کتاب طلایی آزمایش های شیمی آقای راپرت برنت کتابی است که به زبان ساده و شیوه، الفبای آزمایش های شیمی و چگونگی انجام برخی از آن ها در شرایط بیرون از آزمایشگاه و با حداقل وسایل در دسترس، آموزش می دهد . با مطالعه این کتاب خصوصا در مقاطع آموزشی پایین ، برای خواننده ، این امکان فراهم می شود که بتواند دانش شیمی را در اطراف خود تجربه کند. این کتاب برای دانش آموزان کنجدکاو و دانش پژوهانی که امکان ارتباط مستقیم آنها با آزمایشگاه میسر نمی باشد و سوالات ذهن شان ، گاهها آن ها را به چالش می کشاند ، راهکاری مناسب در جهت ارضای توان فکری پرسشگر و جستجوگر آنها می باشد .

اینجانب به عنوان ویراستار علمی کتاب طلایی آزمایش های شیمی راپرت برنت معتقدم که گاهی اندوخته های علمی ما انسان ها به حد و یا مرز تخصص هم می رسد اما ممکن است در این حد از دانش، ساده ترین مطالب پیشینه دانستی ها و انجام برخی امورات از راه ساده تر را از یاد ببریم اما در این اثر زیبا پاسخ این سوال نهفته است .

امید است دستان بخششده یگانه آموزگار هستی، ما را در انجام این ترجمه چنان یاری داده باشد که همانگونه با خواندن اثر مؤلف، زیبایی آن را احساس نمودیم ؛ در ترجمه این اثر توانسته باشیم این زیبایی را به خواننده منتقل کرده باشیم.

دکتر آرش باباخانیان

عضو هیئت علمی دانشگاه

با لطف و عنایات پروردگار توفیق بر این شد که با آشنایی با کتاب طلایی آزمایش های شیمی اثر آقای راپرت برنت ، اراده‌ی ترجمه کردن آن در من مضاعف گردد و این گونه شد که در راستای برطرف ساختن نیازهای علم شیمی ، تمام تجربیات خود را برای ترجمه این کتاب به کار گرفتم. از آنجا که آموزش های عملی مانند کار در آزمایشگاه برای فراغیری علوم ، بسیار لذت بخش تر هستند ؛ این کتاب این امکان را به شما می دهد که در محیط خانگی و با کم ترین و ارزان ترین تجهیزات و امکانات ، ده ها آزمایش شیمی را انجام دهید.

بر این باورم که چون کدهای زیر :

۲۱۸۱۹-۲۶-۲۱-۴۱۵-۸۱۴۱۵۹-۲۱۹۴۹-۲۵-۱۸۱۴۱-۲۱۹۴-۴۶۳۱۵۱-۲۱۹۴

که هر یک از شما معنای خاصی از آن برداشت می کنید (اعداد ، فرمول ، الگو) این شمایید که با نگرش خود به علمی چون شیمی می توانید آن را جذاب تر و خوشایند تر پیدا کنید. در اینجا لازم است از تلاش های جناب آقای دکتر آرش باباخانیان که ویراستاری علمی این کتاب را بر عهده گرفته و زحمات استاد کیومرث رحمنی که ویراستاری ادبی این اثر را انجام دادند و تلاش های آقایان دکتر محمد صدیق قربانی ، استاد آرمان قیسوندی و استاد هوشنگ باتمانی و کمک های برادرم محمد احمدی که همواره مرا به پایان خوشایند این کار امیدوار ساختند ؛ قدردانی و تشکر کنم.

در پایان لازم می داشم که از تمام شما دانش آموزان و دانش پژوهان گرامی تقاضا کنم در صورت داشتن هر گونه انتقاد و یا پیشنهاد در مورد این کتاب با استفاده از پست الکترونیکی مرا در ترجمه بهتر ، کمک کنید. باشد که با لطف و عنایات حق ، شاهد پیشرفت های بیشتری در عرصه های علمی باشیم.

زهرالحمدی (طنین)
ahmadi.tanin@gmail.com




آشپزخانه هر فانه ای یک آزمایشگاه شیمی است
و غذای پختن و شستشو یک عمل شیمیایی است

اهمیت شیمی :

به سختی می توان دختر یا پسری را پیدا کرد که درباره ای موضوعات مختلف، کنجدکاو نباشد و این صفت، دقیقاً مورد نیاز کسانی که به شیمی رجوع می کنند؛ چه بسا این شعار اصلی در شیمی است: دست یافتن به اطلاعات مختلف در مورد مواد و اشیا مختلف: یافتن این که اشیا از چه چیزی ساخته شده اند و چه چیزی مورد دستخوش قرار گرفته است. چه چیزی؟! هیچی! هر چیزی! یک نگاه به اطراف بیانداز! تمام چیزهایی که می بینی و اکثر آن هایی که نمی توانی ببینی، مورد دستخوش دانش شیمی قرار گرفته اند. اجازه بدھید از خودتان شروع کنیم. هوایی که شما تنفس می کنید؛ مخلوطی است از اجزا و ذرات شیمیایی و عمل نفس کشیدن یک عمل شیمیایی است. غذاهایی که شما می خورید همه حاصل تولیدات شیمیایی است و بدن شما و تمام سلول های ماهیچه ای، عصبی، استخوانی و مغز یک راز بزرگ شیمی را در خود جای داده اند. لباسی که شما می پوشید؛ کتابی که می خوانید؛ دارویی که مصرف می کنید؛ خانه ای که در آن زندگی می کنید؛ همه و همه از تولیدات شیمیایی هستند. اوتومبیلی که از آهن تشکیل شده، چرخ هایی که از لاستیک و سوختی که موجب حرکت آن می شود؛ همه از مواد شیمیایی و فرایندهای شیمیایی تشکیل شده اند. خود طبیعت، آزمایشگاه شیمی شگرفی است. هر چیزی که در طبیعت موجود است؛ همواره در معرض تغییرات شیمیایی بوده است. این جا در زمین، گیاهان و حیوانات رشد می کنند؛ می میرند و تجزیه می شوند. صخره بر اثر آب و هوا ترک بر می دارد و خرد می شود. در جهان، ستارگان جدیدی شکل می گیرند و دیگر ستارگان ناپدید می شوند.

خورشید بر ما گرما و روشنایی می بخشد و انرژی بر خاسته از شعله های سوزانش که طی یک فرایند شیمیایی بیلیون ها سال است که پدید می آید.

شیمی یکی از مهمترین دانش ها برای رفاه بشر است . استفاده ای مناسب از علم شیمی این امکان را به کشاورزان می دهد تا محصولات بهتر و بیشتری برای جمعیت در حال افزایش جهان تولید کنند. همچنین این امکان را برای مهندسین فراهم می کند تا با ساخت ابزارهای جدید حمل و نقل و ارتباطات، مردم دنیا را بیشتر به یکدیگر نزدیک کنند ؛ علاوه بر این می تواند شرایطی را ایجاد کند تا پزشکان در درمان بیماری های بشری به موفقیت های بیشتری دست یابند و تولید کنندگان، انواع اقلام مورد نیاز مردم را بهتر و سودمندتر برای زندگی اقشار مختلف تولید کنند .



در مدت این چند سال اخیر ، دانشمندان به موفقیت هایی در مورد رازهای درونی مواد شیمیایی دست یافته اند . علاوه بر این آنها توانسته اند از انرژی عظیمی که در آنها واقع شده است ؛ استفاده کنند . انرژی اتمی امکان استفاده برای آینده کان را ایجاد می کند . شما در جهانی زندگی خواهید کرد که در آن شیمی بسیار اهمیت خواهد یافت .

لازم است که قوانینی در حوزه ای شیمی مدرن که اساس شیمی شده اند را بدانیم و چگونگی حل آن را توسط شیمیدانان گذشته یاد بگیریم.

این کتاب به شما کمک خواهد کرد که به یک دانش درونی دست یابید که نه تنها از طریق خواندن کتاب به آن دست یافته اید بلکه باعث می شود با هوشیاری ، آزمایش ها را تشریح و انجام دهید و پادبگیرید که هر یک از آن ها به شما چه می گویند .

کاغذ و چاپگر و مههر علم شیمی
را بسیار یاری می دهند



گذشتگان شیمی

هزاران سال پیش ، یکی از اجداد شما یک چوب را به داخل گدازه های شناور و داغی که از کوه آتشفسان فواران می شد ؟ فرو کرد . او این چوب دستی را همانند یک مشعل به دست گرفت . نور و گرما تولید می کرد و در آخر به خاکستر تبدیل شد . این انسان قدیمی که این فرایند شیمیابی را ملاحظه کرد ممکن است یکی از اولین شمیدانان جهان بوده باشد . دقیقا او چیزی را در دست گرفته بود که چوب نامیده می شد و به عنوان یکی پدیده شیمیابی ، احتراق یا سوختن و تبدیل آن به مواد دیگر معرفی شد . کشف استفاده از آتش منجر به اولین قدم برای هدایت به سوی شیمی مدرن شد . آتش ، امکان پختن خوراک خام و امکان ایجاد سفالگری و شیشه سازی و آهنگری را به بشر داد . برای هزاران سال ، مردم فقط از نتیجه کارشان شگفت زده می شدند و به اینکه چه چیزی اتفاق افتد و چطور ، توجه نمی کردند . دو هزار و پانصد سال پیش بود که توجه فیلسوفان به مواد سازنده اشیا مختلف و اینکه چه اتفاقی می افتد و چه زمانی آن ها به مواد دیگر تبدیل می شوند ، جلب شد .

چهار صد سال قبل از میلاد ، در یونان اندیشمندی به نام ایمپدکلیس^۱ نظریه ای را مطرح کرد . او توضیح داد که هر چیزی در جهان فقط از چهار مواد ساخته شده است . او این مواد را عنصر نامید . این عناصر عبارت اند از : آتش ، آب ، هوا و خاک . به سوختن چوب در بالا دوباره توجه کنید . این عمل آتش تولید کرد . بنابراین چوب ، آتش را در خود داشت . صدای حرق جرق هنگام سوختن چوب نمایانگر این موضوع است که آب نیز در آن موجود بوده و دود حاصل از آن می تواند نوعی هوا باشد . در آخر نیز به خاکستر تبدیل شد که خاکستر هم خاک است ، به طور قطع هر کسی این را می داند . در جایی دیگری جز یونان ، در همین زمان دموکریت^۲ متولد شد و ایمپدکلیس مُرد . او نظریه ای متفاوتی داشت . او بر این باور بود که همه چیز از جزئی به نام اتم تشکیل شده اند که غیرقابل تجزیه است . بزرگترین فیلسوف آن زمان یونان ، ارسطو^۳ این چهار عنصر را بسط داد و به دلیل آوازه ای بسیارش این نظریه ای اشتباه تا دو هزار سال بر اندیشه دانشمندان حکمرانی کرد .



۱- Empedocles


متولد ۴۳۰ قبل از میلاد در سیسیل

۲- Democritus

متولد ۴۶۰ قبل از میلاد ، مرگ در سال ۳۷۰

۳- Aristotle

متولد ۳۸۴ قبل از میلاد ، مرگ ۳۲۲



ارسطو
aristotle



دموکریت
democritus

دانشمندان عربی به کاری همت گماردند که به آن کیمیاگری می گفتند . آنها مواد را با هم ترکیب می کردند ؛ می جوشانندند و تقطیر می کردند و در نهایت عصاره‌ی آن را می گرفتند ؛ به این امید که که روزی فرا بر سر آن‌ها بتوانند راهی برای ساختن طلا پیدا کنند ! آنها تعداد بی شماری از مواد ناشناخته را کشف کردند . آن‌ها روش‌های آزمایشی بسیاری را توسعه دادند و به علم شیمی شهرت بخشیدند اما هرگز به داشت تبدیل مواد به طلا دست نیافتدند . در سال ۱۵۲۵ میلادی پزشک و دانشمندان سویسی، سفرا توس با مباستوس پراسلسز^۱ نوآوری جالبی به خرج داد . او شاگردان را به پاره کردن کتابهایشان ترغیب می کرد . او شاگردانش را به یادگیری تجربی تشویق می کرد و از آن‌ها می خواست که با انجام آزمایش‌های متعدد به این نتیجه برسند که این نظریه علمی درست است یا نه . اما تعداد کمی از مردم به او توجه کردند . قبیل از اینکه صد سال دیگر بگذرد مرد انگلیسی به نام رابرت بویل^۲ در سال ۱۶۶۱ موفق شد نظریه چهار عنصر را زیر سوال ببرد و رد کند . او مطرح کرد که تعداد زیادی عنصر و مواد وجود دارند که نمی توانند توسط دیگر مواد شکل بگیرند و شکسته و تجزیه شوند .

۱- Theophrastus Bombastus Paracelsus von Hohenheim


۲-Robert Boyle

تولد: ۱۶۲۷ میلادی ایرلند ، مرگ: ۱۶۹۱ ، لندن ، انگلیس

صد سال دیگر گذشت و این دوره با انقلاب آمریکا ، روزی که بالاخره شیمی مدرن طلوع کرد؛ هم زمان بود. مردی اهل سوئد به نام کارل شلی^۱ و مرد انگلیسی به نام جوزف پریستلی^۲ ، اکسیژن را کشف کردند . دانشمندی فرانسوی به نام آتوان لورنت^۳ ، طبیعت درست سوختن و همچنین لیستی علمی از عناصر شناخته شده را ایجاد کردند . در این محدوده چند ساله ، بیشتر عناصر پیدا شده بودند. با کمک الکتریسیته ، شیمیدان انگلیسی ، هامفری دیوی^۴ مواد جدیدی برای روشنایی به نام های سدیم ، پتاسیم ، کلسیم و منیزیم کشف کرد. بیست سال بعد در سال ۱۸۲۸ میلادی ، یک تجزیه مهم دیگر اتفاق افتاد . شیمیدان آلمانی فریدریچ ولر^۵ ، در آزمایشگاهش ماده شیمیابی اوره را تولید کرد که قبل از آن جز از راه حیوانات زنده ساخته نشده بود .



کارل شلی
Karl Scheele



جوゼف پریستلی
Joseph Priestley



هامفری دیوی
Humphry Davy

۱-Karl Scheele

تولد : ۱۷۴۲ میلادی ، مرگ : ۱۷۸۶

۲-Joseph Priestley

تولد : ۱۷۳۳ انگلیس ، مرگ : ۱۸۰۴ میلادی

۳-Antoine Laurent Lavoisier

تولد : ۱۷۴۳ میلادی ، پاریس ، فرانسه ، مرگ : ۱۷۹۴ ، پاریس

۴-Humphry Davy

تولد : ۱۷۷۸ ، مرگ : ۱۸۲۹ میلادی

۵-Friedrich Wohler

تولد : ۱۸۰۰ میلادی ، آلمان ، مرگ : ۱۸۸۲



ماری کوری
Marie Curie

فریدریخ ولر
Friedrich Wohler

پیر کوری
Pierre Curie

عناصر جدید کشف شدند و مواد شیمیایی جدید ساخته . پیشرفت شیمی ، صنعت و کشاورزی و پزشکی را تحت تاثیر قرار داد . در سال ۱۸۹۸ ماری کوری^۱ لهستانی به همراه همسر فرانسوی اش ، بی بی^۲ ، ریز عنصری به نام رادیوم را کشف کردند . این کشف یک تولد جدید در شیمی شد . در طول پنجاه سال شیمی با گام هایی عظیم همچنان به جلو پیش می رفت . اما باید یادمان باشد که رسیدن به شیمی مدرن بدون تلاش اختصاصی و مسئولانه ی شیمیدانان گذشته میسر نمی شد و ما شیمی امروز را مدیون تلاش های آنان هستیم .

۱- Marie Curie


تولد : ۱۸۶۷ میلادی ، لهستان ، مرگ : ۱۹۳۴ ، فرانسه

۲- Pierre Curie

تولد : ۱۸۵۹ میلادی ، پاریس ، فرانسه ، مرگ : ۱۹۰۶ پاریس

وسایل آزمایشگاه





بیشترین کشفیات شیمی توسط دانشمندانی بوده است که از تجهیزات خاصی استفاده نمی کردند ولی این تجهیزات ساده و در دسترس بودند . حتی منزل شما هم می تواند یک آزمایشگاه باشد. کافی است به مثال های این شیمیدانان توجه و آن ها را دنبال کنید . تصورتان را بر روی کار قرار دهید . از ابزارات مناسبی که شما می توانید به راحتی در منزلتان پیدا کنید؛ استفاده شود و فقط مواد یا وسایلی را بخرید که آن را لازم دارید . چندین اقلام مورد نظرتان در داروخانه ها یا فروشگاههای ابزارآلات

شیمیابی ممکن است وجود داشته باشد . در این جا ما به چند وسایل مورد نیاز آزمایش های شیمی اشاره کرده ایم .



برپا کردن آزمایشگاه خانگی

شما می توانید زمانی که والدین تان از آشپزخانه استفاده نمی کنند ؛ از آن برای آزمایش استفاده کنید. ولی بهتر است که شما مکانی به خصوص و مرتب برای نگهداری وسایل و ابزار آلات شیمی داشته باشید ؛ مثلاً گوشه ای از اتاقتان یا پارکینگ .

به این تجهیزات در آزمایشگاه شیمی نیازمند هستید :



میز کار : قدیمی و محمکش هم قابل استفاده است . با یک پارچه پلاستیکی آن را بپوشانید .
آب : اگر شما شیرآب دارید ، مناسب است و گرنه می توانید از بطربی آب ، مطابق شکل استفاده کنید.
دفعه زباله : اگر شما مواد دور ریختنی دارید آن را مستقیما در فاضلاب آشپزخانه بریزید نه در سینک آن و اگر این هم در دسترس نبود شما می توانید از سطل زباله پلاستیکی استفاده کنید .

منبع گرما : در یک آزمایشگاه منظم ، چراغ گازی استفاده می شود . در آزمایشگاه خانگی شما می توانید چراغ هایی با سوخت الكل تقلیبی استفاده کنید .

انبار : اگر اطراف میز کارتان شلوغ نیست و شما قفسه باز دارید این خوب است ولی بهتر است از صندوق یا جعبه ای که دارای قفل باشد برای نگهداری وسایل و مواد استفاده کنید .

ظرروف : مواد شیمیابی را در ظروفی شیشه ای و یا بطربی با برچسب اینکه آنها مواد شیمیابی به نام ... هستند نگهداری کنید .


جای لوله آزمایش : این امکان را به شما می دهد که بتوانید لوله آزمایش ها را در آن نگه دارید.



شما می توانید از نوار پلی‌کاغذی هم
برای نگهدارنده لوله استفاده کنید یا
همانند شکل از مقتول برای درست گردن
گیره استفاده کنید



در آزمایشگاه، اولین وسیله مورد نیاز کپسول امنیتی است طبق شکل می توانید فودتان
یکی بسازید





کپسول امنیتی

وسایل مورد نیاز برای آزمایش ها

بیشتر آزمایش های شیمی در لوله و شیشه های آزمایشگاهی انجام می شود . اما شما بارها به انواع ابزار و وسایلی مانند بطری، درپوش، شیشه و لوله پلاستیکی نیاز خواهید داشت. یک شیمیدان خوب با

فخر و میاهات به ابزار آزمایشگاهی اش نگاه می کند . او به خوبی از آن ها نگهداری می کند ؟ نه برای اینکه تمیز به نظر برسند بلکه برای محافظت از آن ها اقدام به این کار می کند . اگر وسایل قابل اشتعال گازی و یا غیره نشت کردند ؛ خیلی خطرناک هستند.

قبل از اینکه وسایل را با هم در جایی قرار دهیم بهتر است یک تصویر ذهنی از ترکیبات و وسایل به کار رفته در آنها را ایجاد کنیم به این طریق می توانیم حتی در صورت باز شدن اجزای یک وسیله آن را دوباره به هم متصل کنیم . برای ساختن وسایل ، شما باید بدانید که چگونه یک لوله شیشه ای را برش بزنید و یا خم کنید . این عاقلانه است که شما از لوله های آزمایشگاهی استفاده کنید که همه یک قطر یکسان داشته باشند . حداکثر قطر ۶ میلی متری لوله های شیشه ای برای سوراخ های معمولی درپوش های لاستیکی مناسب است . برای قطر مناسب درپوش ها از بطری ها و اندازه گیری دهانه می توانید استفاده کنید در تصویر زیر نمونه ای از اندازه های دقیق و رایج آورده شده است.



نحوه بریدن لوله ها

۱- از یک سوهان مثلثی استفاده کنید.

۲- انگشت شست را در زیر نقطه‌ی سوهان زده شده ؛ قرار دهید .

۳- با دقت بر روی نقطه سوهان زده شده ؛ فشار دهید .

نکات:



۱- حتما خراش را با یک سوهان انجام دهید نه آره!

۲- لوله را با دو دست و با استفاده از انگشت شست نگه دارید.

نحوه خم کردن لوله ها

۱- فقط آن قسمتی را که می خواهید خم کنید زیر شعله بگذارید و آن را جلو و عقب بچرخانید.


۲- گرمای بیش از حد ، باعث پهن و شل شدن بیش از اندازه لوله می شود.



به آرامی آن را از دو طرف
بکشید

اندازه گیری های علمی


در علم، سیستم متریک بر دیگر سیستم ها مقدم تر است . کار با این سیستم بسیار راحت است . از واحدهای مهم اندازه گیری می توانیم متر برای طول، لیتر برای حجم ، گرم برای وزن نام ببریم .



ساختن ترازو




- ۱- می توانید برای کفه ترازو از قوطی ها فلزی استفاده کنید . طبق شکل رو به رو آن را برش دهید.




- ۲- از الگوهای داده شده برای ساختن ترازو استفاده کنید . برای بسیاری از آزمایش ها شما به ترازو نیاز خواهید داشت.

- ۳- شما می توانید از سکه های مختلف برای وزنه استفاده کنید .



اصول مهارت درست آزمایشگاه



- ۱- قبل از اینکه آزمایش را شروع کنید کتاب راهنمای را با دقت بخوانید.
- ۲- همه‌ی وسایل و مواد شیمیایی مورد نیاز را از قبل آماده کنید.
- ۳- به ترتیب کتاب راهنمای، آزمایش‌ها را پیش ببرید.
- ۴- از یافته‌ها و نتایج نکته برداری کنید.
- ۵- بعد از پایان آزمایش‌ها، وسایل استفاده شده را شستشو دهید و تمیز کنید.

در آزمایشگاه های خانگی سه نکته بسیار مهم است: امنیت ، پاکیزگی ، دقت.

امنیت : تمام آزمایش های گفته شده در این کتاب ، اگر در آزمایشگاه به درستی انجام شوند ، امنیت شما را تضمین می کنند. همچون یک شیمیدان بر جسته رفتار کنید تا شیمی هم به شما احترام بگذارد. هیچ چیزی را مزه نکنید مگر اینکه در کتاب برای مواد خاصی این کار لازم باشد . اگر در خانواده شما کودکی وجود دارد ؛ مواد شیمیایی را از دسترسی آن دور نگه دارید . هنگام کار با آتش مراقب باشید . خصوصا وقتي که از چراغ الکلی استفاده می کنید ؛ برای امنیت ، یک کفه فلزی را زیر آن قرار دهید .

پاکیزگی : عادت کنید که وسایل مورد نیاز را در یک سو و وسایل استفاده شده را در طرف دیگر قرار دهید و همیشه فضای بین این دو را تمیز نگه دارید . مواد شیمیایی را در جای دور و مکانی که کمتر در دسترس عموم باشد؛ بچینید و شیشه ها و بطری ها را بعد از استفاده ، شستشو دهید.


دقت : بر روی تمام شیشه هایی که حاوی مواد شیمیایی هستند ، برچسب بزنید . عکس العمل های شیمیایی را با دقت مشاهده و زیر نظر بگیرید و از نتایج آن یادداشت برداری کنید .



هنگام تمیز کردن وسایل
مراقب دستان فود باشید



قبل از استفاده از مواد بروپسب
آن را بفوانید



سعنی کنید درب بطری را در دست خود قرار دهید.

۱- با دست پمپ درب بطری را باز کنید.

۲- درب بطری را در دست پمپ قرار دهید و طبق شکل

محتویات بطری را داخل لوله بریزید.



برای اندازه گیری، در دو کفه ای ترازو، دو

کاغذ سبک به سایز مورد نظر قرار دهید. با


ضریبه های آرام با انگشت اشاره روی بطری،

مواد را روی کاغذهای قرار گرفته در ترازو،

فال کنید.



با استفاده از میله‌ی شیشه‌ای، جریان آب را به ظرف دیگر هدایت کنید.



با استفاده از گیره، لوله آزمایش را بگیرید و هیچ وقت از بالا به آن هزاره ندهید و هنگام هزاره دادن از پایین آن را به چپ و راست مرکت دهید اگر پراغ متهمگ بود با دقیق آن را به چپ و راست مرکت دهید.



از برس مخصوص برای شستن لوله استفاده کنید. به یاد داشته باشید که باید با آب سرد شسته شود.

شماع آقای فارادی

در زمستان سال ۱۸۰۹، مایکل فارادی^۱، دانشمند بزرگ بریتانیایی یکی از بزرگ‌ترین کفراس‌ها را برای جوانان اجرا کرد. او گفت: «مقداری از هر شی، فقط خصوصیت یا پدیده‌هایی همانند شمع دارد. زیر هر قسمت از این جهان، هیچ چیزی، بی هدف نیست و در بالاتر به این پدیده‌ها آموزش داده شده است. درهای باز زیادی که تو آن را بینی و وارد شوی و با فلسفه طبیعت آشنا؛ وجود ندارد. بهتر است که تو، پدیده شمع را بررسی و تشریح کنی» سپس او برای ثابت کردن این موضوع با شمع روشن شروع به کار کرد.

۱-Michael faraday

تولد: ۱۷۹۱ میلادی انگلیس، مرگ: ۲۵ آگوست ۱۸۶۷ میلادی


هنگام روشن کردن شمع شما با جسم جامدی سر و کار دارید . هنگام سوختن با ماده ای مایع رویه رو می شوید ؛ سپس با گاز (دقیق تر بگوییم گازی که همانند بخار است) . در جریان شمع ، محصول ما انرژی است که به صورت گرما و نور دیده می شود . در همین زمان وارد یک واکنش شیمیایی می شویم که معلوم می کند شمع ما از چه چیزی ساخته شده است . زمانی که شما وارد شناخت علم شیمی می شوید ؛ می توانید گزارش های متعددی در مورد آزمایش های مختلف گردآوری کنید همان کاری که آقای فارادی برای جوانان شرح داد .



توسط یک لوله شیشه ای که در درون شعله شمع فرو کرده اید و سر دیگرش را در داخل یک لیوان، می توانید حرکت بفایر که مایل به رنگ سفید است را مشاهده کنید. در صورت مترافق کردن، آن به ماده ای جامدی تبدیل می شود .

شمع دارای هیدروژن^۱ است


زمانی که شمع می سوزد ، تبدیل به آب می شود . توجه : تنها شکل سوختن در اکسیژن^۲ است که به آب تبدیل می شود.



۱- لیوانی سرد را برای چند دقیقه روی یک شمع روشن قرار دهید . شما شاهد تشکیل شبنم در داخل لیوان می شوید.

۲- با انگشتان شما می توانید قطرات آب را به یکدیگر متصل کنید.

شمع دارای کربن^۳ است




۱-Hydrogen

۲-Oxygen

۳-Carbon

یک صفحه‌ی فلزی روی شمع قرار می‌دهیم . حاصل آن تشکیل دوده است . این دوده همان کربن می‌باشد . کدام قسمت از همه داغ تر است ؟ برای یافتن جواب سوال کافی است یک کارت کاغذی را از پهلو بر روی شعله قرار دهید آن گاه شاهد به وجود آمدن یک حلقه دودی هستید.




راه دیگر برای نشان دادن
وجود کربن در شمع این
است که در هنگام سوختن
شمع ، کربن دی اکسید
شکل می گیرد

۱-قیف را روی شمع روشن قرار دهید . مطمئن شوید که خروجی قیف و راس شعله در یک راستا
همستند .

۲-لوله شیشه‌ای را روی سر قیف قرار دهید . هوای داغ را جمع کنید . آب آهک^۱ را درون لوله
بریزید و تکان دهید . شما شاهد تشکیل ابری از کربن دی اکسید^۲ هستید .

۱-Lime Water

۲-Carbon Dioxide



عناصر، ترکیبات، مخلوط

در تمام آزمایش های شیمی شما با ماده ، سر و کار دارید. ماده چیزی است که اتاقی (حجم) را در بر گرفته و دارای وزن است. یک میله آهنی یک ماده است چرا که هم فضا را اشغال می کند و هم دارای وزن است (همانطور که همه می دانید بسیار سنگین است) . آب هم یک ماده است زمانی که شما با آن یک سطل را پر می کنید فضا اشغال می کند و سطل کاملا سنگین می شود. هوای اطراف شما هم یک ماده است که فضای بسیاری را در بر می گیرد و به نظر سنگین نمی آید ولی فشار اتمسفری زمین بر روی هر اینچ مربع بدن شما ، وزنی است برابر با ۱۵ پوند . ماده سه حالت دارد . آهن نام برده شده در مثال جامد^۱ است . آب مایع^۲ و هوا حالت گاز^۳ است .


۱-Solid

۲-Liquid

۳-Gas

اگر شما آهن را به قطعات کوچک تر تقسیم کنید و آنقدر این کار را ادامه دهید تا شما نتوانید آن به ذرات ریزتر تقسیم کنید ، هنوز هم این ذرات ریز، آهن هستند. هر چیزی که شامل یک نوع ماده باشد عنصر^۱ نامیده می شود .


با دست آب را بگیرید . شما یاد خواهید گرفت که آب را تجزیه کنید و با دو ماده سازنده آن ، که عنصر نامیده می شوند ؛ آشنا می شوید . هر چیزی که با دو یا بیشتر از دو نوع عنصر آمیخته شود ، به زبان شیمی آن را ترکیب^۲ می گوییم . در هر ترکیب ، عناصر سازنده همیشه در تابع اند . هوا شامل چندین نوع ماده است اما آن ها با هم ترکیب نشده اند بلکه مخلوط^۳ شده اند . وقتی شما یک مخلوط را می سازید ؛ شما می توانید ذرات را در هر تناسی با یک دیگر مخلوط کنید .



گوگرد^۴ و آهن^۵ می توانند با هم مخلوط شوند و دوباره از هم تفکیک شوند .

- ۱- با استفاده از آهنربا شما می توانید ذرات فلزی را جمع آوری کنید .
- ۲- مقداری هیدروکلوریک اسید^۶ را در داخل لوله های دارای این مخلوط بریزید . شما شاهد هستید که آهن حل می شود ولی گوگرد در آخر باقی می ماند و حل نمی شود .

^۱-Element ^۲-Compound ^۳-Mixture ^۴-Sulfur ^۵-Iron ^۶-Hydrochloric Acid



آب^۱ مهم ترین ترکیب

H_2O
آب مایعی است بی نگ، بدون طعم،
بدون بو دارای نقطه ی جوش ۱۰۰ سانتی
گراد (۲۱۲ فارنهایت) و نقطه انجماد
سانتی گراد (۳۲ فارنهایت)

آب مهمترین ترکیب شیمایی است. بدون آب زندگی وجود نخواهد داشت و تمام انسان ها و حیوانات از فرط تشنگی می میرند و گیاهان از مشدت پژمردگی از بین می روند.

خوبختانه، آب رایج ترین ترکیب در جهان است. سه چهارم سطح زمین را آب پوشانده است. آب برای همیشه در گردش است. با تبخیر از اقیانوس و دریاها و دریاچه ها و دیگر مکان ها به بخاری نامرئی تبدیل می شود. هنگامی که سرد می شوند به صورت قطره در می آیند و به شکل برف و باران بر زمین می بارند و بار دیگر به اقیانوس و دریاها... برمی گردند و این چرخه ادامه می یابد. شیمی از روش های طبیعی برای تولید آب خالص (بدون هیچ افزودنی) استفاده می کند. آب شهری را می جوشنند و به بخار تبدیل می کنند و سپس آن را سرد می کنند. این جریان را تقطیر^۲ می نامند و آب حاصل جریان را آب مقتدر^۳.

۱-Water ۲-Distillation ۳-Distilled Water




یکی از کاربردهای مهم آب در آزمایش‌های شیمی این است که می‌توان از آن به عنوان ملال استفاده کرد.

۱- یک قاشق سوپ خواری کربنات سدیم (جوش شیرین) داخل آب سرد ببریزید. مقداری از آن به آرامی در ملال می‌شود.

۲- همین آزمایش را با آب گرم انها مدهید. می‌بینید که به سرعت در آب مل می‌شود. معمولاً آب داغ ملال پذیری بیشتری دارد.

الکترولیز آب

الکترولیز می‌تواند پیوند بین عناصر آب را بشکند و آن را به هیدروژن و اکسیژن تبدیل کند. شما می‌توانید الکتریسیته مورد نیاز را از سه یا چهار باتری چراغ قوه بدست آورید. به دو قسمت سیم روکش دار مسی نیاز دارید.



۱- میله‌ی کربنی را از وسط خراش دهید و از یک سوهان برای نصف کردن آن استفاده کنید.

۲- یک سر هر سیم را لخت کنید و آن را دور یک طرف هر یک از میله‌های کربنی پیچید.

۳- دور سیم‌های لخت پیچیده شده دور میله‌های کربنی را با نوار چسب خوب پوشانید.

۱- sodium carbonate

دیگر مواد لازم جهت انجام آزمایش:

یک باتری معمولی چراغ قوه می تواند به شما موادی را بدهد که مورد نیاز آزمایش است.


۱- پوشش باتری را باز کنید و با استفاده از یک قوطی باز کن روکش ساخته شده از فلز روی را تمیز کنید.

۲- با استفاده از یک چاقوی کند میله های کربنی را استخراج و تمیز کنید.

۳- ماده ای نمناک سیاهی که بیشتر مشکل از منگنز دی اکسید^۱ است؛ خشک کنید. آن را در یک شیشه نگه دارید. قسمت های باقیمانده ای دیگر باتری را می توانند دور بیاندازید.

الکترولیز:

آب رسانای ضعیف برق است. بنابراین شما باید یک قاشق سوپ خوری جوش شیرین را در نیم کوارت آب حل کنید و یک لیوان آب پر و دو لوله شیشه ای را از این محلول پر کنید. سپس همانند شکل نشان داده شده اقدام کنید.



۱- کربن الکترودها را همانند شکل به صورت شب دار در لوله های آزمایشگاهی قرار دهید.

۲- سه یا بهتر است از چهار باتری چراغ قوه استفاده کنید آن ها را به صورت متوالی به یکدیگر وصل کنید و با نوار چسب به یکدیگر بچسبانید.

۱-Manganese Dioxide

۳- با نوار چسب یک سر دو سیم که بدون عایق هستند را به باتری وصل کنید توجه داشته باشید که سر دیگر این سیم‌ها به میله‌های کربنی وصل است.

۴- همانند ۳ عمل شود.

بعد از اینکه ارتباط برقرار شود شما شاهد تشکیل حباب‌هایی در دو لوله خواهید بود.


اکسیژن، نفس زندگی

اگر شما بتوانید برای چند دقیقه نفس تان را حبس کنید تا هیچ مقدار از اکسیژن وارد شش هایتان نشود؛ قطعاً با استمرار این کار خواهید مرد. برای هزاران سال مردم می‌دانستند که انسان بدون هوانی تواند زندگی کند.

کارل شیلی، شیمیدان سوئدی در سال ۱۷۷۲ و جوزف پریستلی انگلیسی در سال ۱۷۷۴ اکسیژن را کشف کردند و اهمیت آن را در زندگی و هوا برای مردم شرح دادند.

آبی که شما می‌شناسید متشکل از دو هیدروژن و یک اکسیژن است.

اتمسفر هم دارای اکسیژن است




۱- یک شمع را در داخل یک بشقاب متوسط محکم بچسبانید و درون بشقاب را پر از آب کنید سپس شمع را روشن و یک شیشه خالی را روی آن قرار دهید.

۲- بعد از مدتی شمع خاموش می شود و آب به داخل شیشه نفوذ می کند و جایگزین اکسیژن می شود.

ساختن مقدار کمی اکسیژن :



یک چهارم شیشه را پر از هیدروژن پراکسید^۱ درصد کنید . با پنس (گیره فلزی) مقداری منگنز دی اکسید را که از باتری چراغ قوه استخراج شده ، اضافه کنید.



۱- برای جمع آوری اکسیژن شما به یک ظرف شیشه ای بزرگ و عمیق و پر از آب نیاز دارید همچنین باید یک پل فلزی هم مطابق شکل به آن وصل شده باشد.


۲- با توجه به شکل شما باید با از درپوش چوب پنبه ای که لوله ای شیشه ای از وسط آن رد شده و یک سر آن در داخل بطری و سر دیگرش به یک شلنگ با طول مناسب وصل است ؛ استفاده همچنین سر دیگر شلنگ به پل فلزی رسیده است.

۱-Hydrogen Peroxide

۳- یک چهارم بطری را پر از هیدروژن پراکسید ۳ درصد کنید و یک هشتم قاشق غذاخوری منگنز دی اکسید به آن اضافه کنید و در پوش را روی آن قرار دهید.

۴- شیشه را پر از آب کنید و آن را روی پل فلزی قرار دهید و سر دیگر لوله توضیح داده شده را داخل آن بگذاریم چنان که شاهد تشکیل حباب اکسیژن داخل آن باشیم. حباب های اکسیژن با قدرت، جایگزین آب می شوند.

۵- زمانی که شیشه پر از اکسیژن شد جای صفحه شیشه ای را روی آن می گذاریم (می توانیم از در پوش هم استفاده کنیم) البته این کار را باید طوری انجام دهیم که اکسیژن آزاد نشود.



هیدروژن سبک تر از همه

H

هیدروژن؛ عنصر اول جدول تناوبی
با وزن ۱/۰۰۸، بدون نگ، بدون بو،
گاز قابل اهتزاق، بسیار واکنش
پذیر و قابل انفجار با هوا و دارای
انحلال پذیری کم با آب است.

هیدروژن از سبک ترین عناصر است و وزنی حدود یک چهارم هوا را دارد. به همین دلیل از آن برای پر کردن بالن ها استفاده می شود. اولین کسی که با استفاده از هیدروژن بالن را به هوا فرستاد، دانشمندی فرانسوی به نام جکس چالرز^۱ بود. وی در سال ۱۷۸۳ زندگی می کرد. خطر احتمال انفجار این گاز در در فاجعه هیندربرگ در شش می ۱۹۳۷ در ایالت نیوجرسی آمریکا برای همه نمایان شد.

۱-Jacques Charles

تولد: ۱۷۴۶ میلادی، فوت: ۱۸۲۳، پاریس

۲- زمانی که کشتی مملو از هوا از سفر اقیانوس اطلس بر می گشت و به بالای لیکه رست نیوجرسی رسید؛ منفجر شد و جان سی و شش نفر را گرفت.

هیدروژن یکی از عناصر مهم به شمار می آید . در زندگی در بیشتر اجسام ، این ماده موجود است برای مثال بدن ما تقریبا دارای دو درصد هیدروژن است. آبی که شما می شناسید عنصر هیدروژن را دربرگرفته و یا هر چیزی که شما می خورید، می نوشید ، می پوشید . حتی مواد مصرفی روزانه شما مثل گازوئیل ، سوخت و روغن و گاز خانگی هم از مناطق حضور هیدروژن محسوب می شود. در آزمایشگاه خانگی، شما می توانید با استفاده از استخراج فلز روی^۱ از باتری چراغ قوه و اضافه کردن آن به اسید هیدروکلریک^۲ (جوهر نمک) که شامل هیدروژن و کلر^۳ است ؛ هیدروژن بسازید. همانی کاوندیش^۴ در سال ۱۷۶۶ هیدروژن را کشف کرد.

هیدروژن به شکل آب تشکیل می شود زمانی که ما به آن گرمایی دهیم :

- ۱- سه چهارم لوله ی آزمایشگاه را پر از اسید هیدروکلریک کنید . یک جفت نوار(باریکه) روی^۱ را به آن اضافه کنید. حباب های هیدروژنی به وجود می آیند.
- ۲- با استفاده از یک درپوش سر لوله را بندید و نصف یک میله شیشه ای را از وسط درپوش به داخل لوله فرو کنید . وسایل را با استفاده از یک حolle پوشانید.

- ۳- یک لوله یا لیوان خالی را بالای میله شیشه ای قرار دهید. بعد یک دقیقه اگر این لیوان پس از یک




دقیقه حالت پوست پوست شدن به خود گرفت آن را برمی داریم و با یک لیوان دیگر امتحان می کنیم تا شاهد انجام درست آن باشیم.

- ۴- لیوان بالای شعله هیدروژن را سرد می کنیم شبنم در داخل آن تشکیل می شود که نشان دهنده ای شکل گیری آب است.

۱-Zinc ۲-Hydrochloric ۳-chlorine

۴-Henry Cavendish

تولد : ۱۷۳۱ ، فرانسه ، مرگ : ۱۸۱۰ میلادی ، لندن ، انگلیس



هیدروژن، سیک ترین گاز شناخته شده:

- ۱- یک چهارم بطری نوشابه پر از اسید هیدروکلریک کنید و دوازده عدد باریکه ای روی ، داخل آن را بریزید. اجازه ندهید شعله ای شکل بگیرد.
- ۲- یک بادکنک را در دهانه بطری وصل کنید.
- ۳- وقتی که بادکنک باد شد با یک نخ همانند شکل سر آن را محکم ببندید تا از هدر رفتن باد جلوگیری شود.

هنگام کار با هیدروژن مراقب باشید

- در ترکیب با هوا ، هیدروژن بسیار قابل اشتعال است بنابراین توجه به نکات زیر ضروری است:
- ۱- مقدار کمی هیدروژن را در آزمایشگاه خانگی نگه دارید. یک مولد می تواند هیدروژن مورد نیاز تان را فراهم کند. همه شرایط و وسائل که مرتبط با هیدروژن هستند را محفوظ از هوا نگه دارید.
 - ۲- مشعل حاصل از آن را از مولد به دور نگه دارید.

CO ₂
کربن دی اکسید : وزن مولکولی ۴۴؛ بدون نگ و گازی بی بو است، قابل امتصاق نیست، انحلال پذیری نسبتاً خوبی در آب دارد.

کربن دی اکسید

در بسیاری از آزمایش ها شما یاد گرفتید هنگام سوختن، کربن دی اکسید آزاد می شود. کربن دی اکسید یکی از گازهای مهم در زندگی انسان هاست . گیاهان سبز هنگام تابش نور خورشید کربن دی اکسید را می گیرند و با ترکیب آن با اکسیژن و هیدروژنی که در آب و در بسیاری از مواد معدنی خاک موجود است؛ میوه جات و سبزیجات را تولید می کنند و

انسان ها و حیوانات از آن تغذیه می کنند.

شما نمی توانید دی اکسید کربن را در هوا ببینید اما هنگامی که سرد و فشرده شود و به صورت یخ خشک در آورده شود ؛ قابل دیدن می شود. هنگامی که آب و دی اکسید کربن را با هم ترکیب می کنید اسید ضعیفی به وجود می آید .



شما با کمک اسید ضعیف (مانند جوهر سرکه) می توانید کربن دی اکسید را از بسیاری از کربنات ها بیرون بکشید.



مایع کربن دی اکسید در پیسول
آتش نشانی مورد استفاده قرار
می گیرد

خصوصیات دی اکسید کربن:

دی اکسید کربن از هوا سنگین تر است و آتش و سوختن را پشتیبانی نمی کند. شما می توانید این دو نکته را ثابت کنید.



۱- یک قاشق چای خوری جوش شیرین در یک پارچ بریزید. مقدار کمی سرکه سفید روی آب بریزید.

۲- یک شمع روشن را با استفاده از یک سیم ، در داخل شیشه وصل کنید کربن دی اکسید داخل پارچ را داخل شیشه بریزید. زمانی که کربن دی اکسید به قسمت بالای شمع می رسد، شعله خاموش می شود.

نیتروژن^۱

N
نیتروژن : عنصر هفتم جدول
تتاویبی با وزن ۱۴/۸۰۰ است
بدون ذگ و گازی بی به است و
سوفتن را پشتیبانی نمی کند
انهال پذیری کمی در آب دارد.

هرگاه چیزی را در هوا بسوزاید ؛ فقط یک پنجم
هوا وارد ترکیبات شیمیایی می شود که در حال
سوزایدن آن هستید. باقیمانده بجز کسر کوچکی وارد
جریان نمی شوند. این نیتروژن است ؛ بیشترین عنصر
آزاد در زمین .


نیتروژن چیزی است که شما ممکن است آن را عنصر
تبیل و سست صدا بزنید.

یک شیمی دان فقط در دمای بالا و زیر فشار زیاد

است که می تواند ترکیبات نیتروژن را با یک عنصر دیگر ، هیدروژن ترکیب کند؛ در این صورت
گاز آمونیاک^۲ تشکیل می شود. هنوز در طبیعت باکتری های کوچکی بر روی ریشه های معینی از
گیاهان موجودند که می توانند نیتروژن را از هوا بگیرند و آن را با اکسیژن و مواد معدنی در خاک
ترکیب و به نیтратات^۳ تبدیل کنند و برای همه می ما از اهمیتی خاصی داراست.


گیاهان برای نکامل به نیтратات نیاز دارند. اگر گیاهان به طور طبیعی نیтратات را دریافت نکنند ؛
کشاورز باید به خاک آن ها مقداری کود حاوی نیтратات اضافه کند.

شما با کار کردن با خود نیتروژن چندان راضی نخواهید شد اما شما به طور جالب می توانید مقداری
از آن را همراه با ترکیباتش ، مخصوصا گاز آمونیاک پیدا کنید.





این شکل می تواند شما را راهنمایی کند پس با دقت آن را بررسی کنید.

نیتروژن در اتمسفر:



آمونیاک



قابلیت انحلال شگفت آور آمونیاک می تواند بسیار تماشایی باشد.


- 1 - همانند تصویر این دستگاه را بسازید و آن را پر از آب کنید و پنج قطره فنول فتالئین به محلول اضافه کنید.

۲- یک بطری خشک و خالی را به آمونیاک آغشته کنید و آن را مطابق شکل روی بطری اولی قرار دهید.(مطابق شکل آن را روی درپوش قرار دهید)

۳- همانطور که از شکل پیداست از طریق یک لوله شیشه ای با زاویه نو درجه ، چند قطره آب بریزید.

۴- ناگهان آب از بطری پایینی به بطری بالایی فوران می کند و به رنگ صورتی در می آید.

معمای دود سفید



۱- داخل بطری را با مقدار کمی هیدروکلریک اسید خیس کنید همچنین با اسید اضافی پشت آن را هم آغشته کنید. روی بطری را با یک مقوای نازک پوشانید.

۲- یک بطری دیگر را با آمونیاک پر کنید و آن را روی مقوای نازک قرار دهید .

۳- بطری پر از آمونیاک را محکم نگه دارید و مقوای را فورا بیرون بکشید. بلافضله هر دو بطری از دود کریستال کلراید آمونیم پر می شونند.

کلر

CL
کلر، عنصر هفدهم با وزن اتمی ۳۵/۴۵، زرد مایل به سبز است. گاز فله کننده و دارای قدرت ترکیب با دیگر عنصر و انتقال پذیری متوسط با آب می باشد.

کلر یکی از گازهای مهم است. ما نمی توانیم با اطمینان، آبی را که بدون مقدار کمی کلر است بنوشیم چراکه وجود مقداری کلر در آب باعث از بین رفتن میکروب ها می شود. همچنین به صورت پهناور از آن در مواد سفید کننده استفاده می کنند. اگر از آن به درستی استفاده شود گازی است مساعد؛ اما اگر از آن نامناسب استفاده شود به ماده ای خطرناک تبدیل می شود؛ به این دلیل که می تواند بر روی دستگاه تنفسی تاثیر بگذارد و به

عنوان یک گازی سمی می تواند استفاده شود که تلفات و ضایعات جنگ جهانی اول ، دال بر این است. شما می توانید گاز کلر زرد مایل به سبز را با استفاده از یکی از ترکیباتش از جمله هیدروکلریک اسید که شامل هیدروژن و کلر است و یا با استفاده از ماده سفید کننده رختشویی که محلولی از سدیم هیپوکلرات^۱ است ؛ تهیه کنید .

نکته ۱} یک بطری آمونیاک رقیق خانگی داشته باشد (۰.۹۰٪ آب و ۱۰٪ آمونیاک خانگی) ، اگر بوى کلر قوى باشد حتماً بینی خود را پوشانید تا از صدمه به دستگاه تنفس جلوگیری کنید.


نکته ۲} سعی کنید این آزمایش ها را در فضای آزاد انجام دهید و در صورت انجام آن در مکانی خاص درها و پنجره ها را حتماً از قبل باز کنید. مراقب باشید گاز را استشمام نکنید.

ساختن کاغذ آزمایش برای کلر :

۵ گرم (یک چهارم فاصله چای خوری) نشاسته^۲ و سی میلی لیتر آب را با هم ترکیب کنید. آن را با چراغ الکلی حرارت دهید. مقدار کمی یید پتابسیم^۳ در آن حل کنید (به اندازه دو دانه گندم) نوار کاغذ صافی را در داخل آن قرار دهید سپس آن ها را خشک کنید.

کلر از هیدروکلریک اسید:

۵ گرم (یک هشتمن فاصله چای خوری) منگنز دی اکسید را داخل لوله آزمایش قرار دهید. ۳ میلی لیتر (یک هشتمن لوله آزمایشگاه) هیدروکلریک اسید رقیق نشده به آن اضافه کنید. به آرامی آن را حرارت دهید . کلر شکل می گیرید. مقداری از آن به هوا رانده می شود. مراقب باشید استشمام نشود.



۱-Sodium Hypochlorite (NaClO)

۲-Starch

۳-Potassium iodide

۲- گاز را با قرار دادن کاغذ های تستی که از قبل آماده کردیم امتحان می کنیم . آن را روی لوله قرار می دهیم کاغذ به رنگ آبی در می آید.

ساختن کلر در آزمایشگاه خانگی :



۱- وسایلی که در بالا نشان داده شده اند را تهیه کنید. یک اینچ مایع سفید کننده در بطری A بریزید بطری B خالی است. بطری C دارای آب است و یک دوم چای خوری آب قلیایی هم در آن حل شده است.

۲- در پوش A را در بیاورید و یک دوم چای خوری سدیم بی سولفیت^۱ در آن بریزید و دوباره درب آن را قرار دهید.

۳- گاز کلر شکل می گیرید و بطری B را پر می کند.

۴- آب قلیایی^۲ در بطری C کلر اضافی را جذب می کند.

نکته زمانی که واکنش به آرامی پیش رفت سدیم بی سولفیت بیشتری اضافه کنید.

^۱-Sodium Bisulfate

^۲-Lye Water

مختصر نویسی شیمیایی :

تا اینجا شما با اکسیژن ، هیدروژن ، کربن دی اکسید ، نیتروژن و کلر آزمایش کرده اید همچنین شما عناصر سازندهٔ آب را از هم جدا کرده اید و عناصر آهن و گوگرد را با هم ترکیب کرده اید. در نکته برداری از آزمایش هایتان ، شما مطمئن هستید که آنها را بسیار سریع یادگرفته اید و به این درک رسیده اید. در مواردی، از خلاصه نویسی می توان استفاده کرد مثلاً حرف H را به جای هیدروژن می نویسند. استفاده از مخفف های اسامی مختلف عناصر، بیشتر از اسامی کامل شان در جهان امروز، معقولانه و ساده تر به نظر می رسد. این روش حتی در کارهای شیمی دانهای صدھا سال گذشته هم به روش های مختلف به کار رفته است. در شیمی امروز در دسر بسیار نوشتمن دیده نمی شود اما این مورد (کامل نوشتمن) برای کیمیاگرانی که آزمایش هایشان را می نوشتند الزامی بود چراکه آنها می بایست رده پاهای قدم هایی که در هر آزمایش به جای می گذاشتند؛ دنبال می کردند تا به هدف شان که یافتن روشی برای تبدیل مواد به طلا بود؛ بر سند. آنها نمادهای پیچیده ای اختراع کردند که فقط خود می توانستند از آن سر در بیاورند و استفاده کنند. زمانی که شیمیدانها به کاوش های عمیق و عمیق تری برای یافتن اسرار مواد دست زدند این نکته الزامی شد که باید برای نوشتمن آزمایش هایشان روشی بیابند که دیگر شیمی دانها هم بتوانند آن را بفهمند و درک کنند. اولین نماد سودمند توسط جان دالتون^۱، دانشمند انگلیسی اختراع شد. اختراعی که برای او الزامی بود.



جان دالتون

John dalton

شیمی دان سوئدی، جان جیکاب بزریلس^۲ سیستم را ساده تر کرد و توسعه بخشید، سیستمی که هم اکنون توسط دانشمندان استفاده می شود. او با استفاده از حروف لاتین نام عناصر را برگزید. مثلاً C برای کربن . جایی که دو نام با دو حرف مشابه شروع می شدند او حرف

۱-John Dalton

تولد: ۱۷۶۶ میلادی انگلیس، مرگ: ۲۷ جولای ۱۸۴۴ منچستر، انگلیس

۲-Jons Jakob Berzelius

تولد: ۱۷۷۹ میلادی سوئد، مرگ: ۱۸۴۸ آگوست


کوچک تر را به یکی از نمادها اضافه می کرد به این طریق او عنصر را از دیگری تمیز داد.

C = Carbon

Ca = Calcium

او با این کار شیمی را یک قدم به جلوتر پیش برد.

جوزف لویس پروست^۱ به این کشف رسید: زمانی که عناصر ترکیبات را می سازند این ها همیشه ترکیبات معینی هستند (قانون ترکیب معین)^۲.



برای مثال مولکول های آب همیشه شامل ترکیب های معینی از هیدروژن و اکسیژن هستند. دالتون بی برده بود زمانی که دو عنصر از راههای مختلف با یکدیگر ترکیب می شوند نسبت های معینی ایجاد می کنند(قانون نسبت های چندگانه)^۳. یک اتم اکسیژن و یک اتم کربن می توانند مونوکسید بسازند؛ یک اتم کربن و دو اتم اکسیژن می توانند دی اکسید کربن بسازند. برزیلیس نمادهایی را ساخت که نه تنها عنصر را معرفی می کند بلکه وزن اتمی آن ها هم در بردارد. او همچنین برای نشان دادن ترکیباتی که چند عنصر را شامل می شدند در «فرمول»^۴ نماد عناصر را کار هم قرار داد مانند مثال های زیر:

CO , HCl , FeS

مونوکسید فقط به این معنا نیست که یک اتم کربن با یک اتم اکسیژن ترکیب شده است بلکه به باید

۱-Joseph Louis Proust


تولد: ۱۷۵۴ میلادی، فرانسه، مرگ: ۵ جولای ۱۸۲۶ میلادی

۲-Law of Definite Composition ۳-Law of Multiple Proportions ۴-Formula

گفت که کربن با وزن اتمی ۱۲ (هر اتم کربن دارای وزن اتمی ۱۲ است) با یک اتم اکسیژن با اتمی ۱۶ (هر اتم اکسیژن دارای وزن اتمی ۱۶ است) ترکیب شده و مونوکسید را با وزن اتمی ۲۸ به وجود آورده است. زمانی که ترکیبات شامل چند اتم مشابه هستند این دانشمند با قرار دادن شماره تعداد اتم در جلوی نماد اتمی نو آوری تازه ای به خرج داد. بعدها اعداد به شکل کوچکتر زیر نمادها قرار گرفتند که به این ها در علم شیمی زیروند^۱ می گویند.



در سال های اخیر نظریه دالتون دست خوش تغییراتی قرار گرفته است. امروزه ما دارای ماشین آلاتی همانند سیکلولترون که می تواند اتم را بمباران کند و آن را به قسمت های نوترون^۲، پروتون^۳ و الکترون^۴ تقسیم کند. طبق نظریه امروزی پروتون و نوترون در هسته قرار دارند و الکترون به دور هسته می چرخد. نظریه دالتون هنوز هم در واکنش های شیمیایی استفاده می شود.



سیکلولترون
cyclotron

امروزه هم روش برزیلیس هنوز هم به عنوان روشی ساده در بین دانشمندان مرسوم است.

^۱-Subscript ^۲-Neutron ^۳-Proton ^۴-Electron

جدول تناوبی عناصر^۱

Periodic table of the elements

The table includes the following descriptive text:

- *Numbering system adopted by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).
- **Numbering system widely used, especially in the U.S., from the mid-20th century.
- ***Discoveries of elements 112–116 are claimed but not confirmed. Element names and symbols in parentheses are temporarily assigned by IUPAC.
- © 2006 Encyclopædia Britannica, Inc.

زمان می گذشت و مردم همچنان به دنیال راهی بودند که بتوانند کشفیات و ذرات و مواد را تشریح کنند.

فیلسوافان به این اتفاق نظر رسیدند که مواد از چیزی ساخته شده اند که به آن عنصر می گویند اما منظور آنان از عنصر ، با عنصری که امروزه می شناسیم کاملاً متفاوت است. فیلسوافان یونانی بر این باور بودند که کل جهان بر چهار عنصر آب ، خاک ، آتش و هوا است. برای قرن ها این نظریه باقی ماند . رومی های قدیم از نه عنصر که امروزه هم آنان را می شناسیم ، آگاه بودند : کربن ، گوگرد ، طلا^۲ ، نقره^۳ ، آهن ، مس^۴ ، قلع^۵ ، سرب^۶ ، جیوه^۷ . در سال ۱۸۰۰ میلادی نیز سی و چهار عنصر دیگر نیز شناخته شدند . در طول ده سال بعد نیز سیزده عنصر شناخته شدند و به عناصر شناخته شده اضافه شدند که می توانیم به سدیم ، پتاسیم^۸ و آلومینیم^۹ اشاره کنیم . با آمدن قرن بیستم میلادی تعداد

۱-The Periodic Table of the Elements ۲- Gold ۳- Silver ۴- Copper

۵- Tin ۶- Lead ۷- Mercury ۸-Potassium ۹- Aluminum

عناصر شناخته به هشتاد و چهار عنصر رسید . امروزه این عدد به صد و دو رسیده است که دو عنصر آن با استفاده از شکافت هسته ای کشف شده است . هنوز هم این امکان وجود دارد که تعداد عناصر کشف شده افزایش یابند.

راز محلول ها

مدت هاست که دانشمندان با انواع محلول ها آزمایش می کنند . مایعی که برای ساختن محلول مورد استفاده قرار می گیرد (معمولآب است) که به آن حلال^۱ می گویند . ماده و مواد که حل می شوند ماده حل شده^۲ نامیده می شوند .

زمانی که شیمیدان ها شروع به استفاده از الکتریسیته به عنوان ابزار کردند آنها متوجه شده اند محلول های مختلف رفتار های مختلفی از خود نشان می دهند . برای مثال شکر موجود در آب این اجازه را به الکتریسیته نداد که گذر کند . آنها نارسانا^۳ بودند .

انواع دیگری از مواد شیمیایی هستند که به راحتی الکتریسیته را عبور می دهند که به آن ها رسانا^۴ می گویند . در سال ۱۸۷۴ دانشمند سوئدی به نام إسونت آرهینیوس^۵ تئوری شرح رفتارهای اسرار آمیز محلول ها را بسط داد . او در آن زمان فقط بیست و پنج سال داشت .

Svante Arrhenius
إسونت آرهینیوس





۱-Solvent ۲- Solute ۳- Non-conductor ۴- Conductor

۵-Svante Arrhenius

تولد: ۱۸۵۹ میلادی، سوئد، مرگ: ۲ اکتبر ۱۹۲۷ میلادی

نظریه‌ی او درمورد رفتار الکتریسته در آب بود . هر مولکولی با الکتریسته بار شده از هم می‌شکند (جدا می‌شود) و به اتم‌ها با گروههای اتمی تبدیل می‌شود. این اتم‌ها یا گروههای اتمی آرنیوس «یون»^۱ نامیده می‌شوند . این اسم در زبان یونانی به معنای سرگردان شدن یا منحرف شدن است . نظریه او به عنوان «نظریه یونش آرنیوس»^۲ مطرح شد . برای مثال زمانی که نمک خوراکی (سدیم کلرید) در آب حل شد و به یون تجزیه می‌شد بار مثبت آن یون سدیم و بار منفی آن یون کلر می‌شد. این یون‌ها تا زمانی که یک جریان الکتریکی در محلول برقرار شود؛ سرگردانند. زمانی که چنین جریانی تشکیل شود یون‌های مثبت به سمت قطب منفی و یون‌های منفی به سوی قطب مثبت حرکت می‌کنند. این یون‌ها باعث ایجاد جریانی بین محلول و رسانا شدن آن می‌شوند . در نتیجه نظریه یونش آرنیوس یکی از قطعات گمشده‌ی جورچین شیمی را یافت و آن را تشریح کرد. البته نظریه او در طول سال‌ها بهبود و اصلاح شد ولی بیشتر روابط و نسبت‌ها هنوز هم درست هستند.



محلول سیر شده^۳


محلول سیر شده محلولی است که در یک دمای مشخص مواد و یا ماده شیمیایی بیشتری را در خود حل نکند .

۱-بیست میلی لیتر آب با دمای معمولی(محیط) در یک ظرف دهان گشاد بریزید و شش گرم شوره قلمی^۴ (نیترات پتاسیم) به آن

^۱-Ion ^۲-Arrhenius theory of ionization ^۳-Saturated ^۴-Saltpeter

اضافه کنید سپس آن را بهم بزنید تا نیترات پتاسیم خوب در آن حل شود.

۲- سه گرم بیشتر نیترات پتاسیم به آن اضافه کنید و بهم بزنید . مقداری از این نیترات پتاسیم^۱ دیگر حل نمی شود. واضح است که مایع در دمای اتاق سیر شده است .



۳- ظرف حاوی محلول را زیر چراغ الکلی قرار می دهیم و ده گرم نیترات پتاسیم به آن اضافه می کنیم. به زودی همه ای آن ها حل می شوند . در دماهای بالاتر این مقدار برای ساختن محلول سیر شده افزایش می یابد . (در حال جوشیدن ، ۴۹ گرم نیترات پتاسیم در ۲۰ میلی لیتر آب حل می شود).

۴- محلول را از روی چراغ الکلی بردارید . زمانی که سرد شود ؛ نیترات پتاسیم به صورت بلور از آن خارج می شود در واقع به آرامی متبلور^۲ می شود. مایع دوباره به حالت محلول نیترات پتاسیم در دمای اتاق باز می گردد.


کار با اسیدها^۱

یک اسید را پکونه می شناسید؟

بسیاری از اسیدها ویژگی های مشترکی دارند . آن ها ترش مزه هستند. شما می توانید با یک شناساگر شاهد تغییر رنگ آن باشید . آنها شامل هیدروژن هستند که می توانند با یک فلز جا به جا شوند . آن ها باز ها^۲ را خشی می کنند . اما یک اسید چیست؟ قبل اینکه اسم اسیدی ، ویژگی و عنوانی برای بیان اسید بود اما با در ک اتم امروزی، در تعریفیش تفاوتی است . شما به خاطر دارید که هسته ای بک اتم دارای ذره ای با بار مثبت به نام پروتون است . اسیدها در محلول، پروتون را مانند یون مثبت هیدروژن آزاد می کنند . اسید پروتون را تولید می کند و یا به دیگر اجزا می بخشد . اسید ها اهدا کننده پروتون هستند . پیش تر اسید ها به عنوان سولفیریک اسید^۳ ، نیتریک اسید^۴ و هیدروکلریک اسید در صنعت استفاده می شدند. سولفیریک اسید و نیتریک اسید هیچ گاه نباید در آزمایشگاه خانگی استفاده شوند . آنها بسیار خطرناک هستند . آن ها باعث تخریب پوست و در صورت تماس با چشم باعث نایابنایی شما می شوند . (در این کتاب هرجا آزمایشی مرتبط با سولفیریک اسید انجام شده از سدیم اسید سولفید^۵ استفاده شده .)

۱- تست ترشی اسیدها :

پنج میلی لیتر هیدروکلریک اسید را به پانزده میلی لیتر آب اضافه کنید . پنج قطره از این ترکیب را در یک لیوان آب بریزید . انگشت خود را به این اسید رقیق آغشته کنید و آن را مزه کنید .




۱- Acids ۲- Bases ۳-Sulfuric Acid(H_2SO_4) ۴- Nitric Acid (HNO_3)
۵- Sodium Acid Sulfate($NaHSO_4$)

عکس العمل اسیدها با شناساگر^۱

چند قطره هیدروکلریک رقیق را روی یک نوار آبی کاغذ تورنسل^۲ بریزید . کاغذ تغییر رنگ می دهد و به رنگ قرمز تبدیل می شود .

عکس العمل اسیدها با فلزات



نواری از فلز روی را در یک لوله آزمایشگاهی قرار دهید . مقداری هیدروکلریک اسید روی آن بریزید. شما شاهد حل شدن روی و آن خواهید بود.

ساختن شناساگر خانگی

برگ های یک کلم قرمز را تکه تکه یا رنده کنید . آن را در آب داغ بریزید و نیم ساعت نگه دارید . آب آن را خارج کنید و می توانید به عنوان شناساگر استفاده کنید . البته شما می توانید از بسیاری دیگر از میوه ها و گیاهان با آب داغ عصاره بگیرید و به عنوان شناساگر استفاده کنید.

اقلام خانگی که دارای اسید هستند



لیمو ، پرتغال ، گوجه فرنگی ، سرکه ، نوشابه غیر الکلی ، چای ، اسپرین ... این ها اسید را در خود دارند .

^۱-Indicators

^۲-Litmus paper

کار با بازها

چگونه یک باز را می شناسید؟


بازها دارای مزه تلخ هستند. در تماس با شناساگرها تغییر رنگ می دهند. در ترکیباتشان اتم های هیدروژن و اکسیژن دیده می شود که به آن هیدروکسیل^۱ می گویند. آن ها اسیدها را خنثی می کنند. اما باز چیست؟ زمانی که یک باز در آب حل می شود یون منفی هیدروکسیل را آزاد می کند. وقتی که یک باز خنثی می شود؛ بار مثبت پروتون را از عضو دیگری می پذیرند. یک باز ذره ای است که پروتون دیگر اجزا را می پذیرد و با آن ترکیب می شود. بازها گیرنده و پذیرنده ی پروتون هستند. از مهمترین بازها می توانیم سدیم هیدروکسید^۲ (آب قلیایی)، آمونیم هیدروکسید^۳ (آمونیاک) و کلسیم هیدروکسید^۴ نام برد. از سدیم هیدروکسید برای مصارف خانگی از جمله تمیز کردن فاضلاب و سینک دستشویی و ظرف شویی استفاده می کردند. در استفاده از آن در آزمایش ها مراقب باشد. از لمس آن خودداری کنید. روغن طبیعی را در خود حل می کند. برای چشمانتان بسیار خطرناک است.

مزه ناخوشایند بازها: پنج گرم (یک قاشق غذاخوری) سدیم هیدروکسید در پنجاه میلی لیتر آب حل کنید. پنج قطره از محلول را در یک لیوان آب بریزید. انگشت خود را در لیوان فرو ببرید سپس آن را مزه کنید.

عکس العمل بازها با شناساگرها

چند قطره سدیم هیدروکسید را روی کاغذ تورنسل قرمز رنگ بریزید. کاغذ به رنگ آبی تغییر می کند.


عکس العمل بازها با چربی ها



چند تکه چربی کوچک را به پنج میلی لیتر سدیم هیدروکسید اضافه کنید. به آرامی به آن گرما دهید. چربی حل می شود و به صابون تبدیل می شود.

^۱-Hydroxyl ^۲-Sodium Hydroxide ^۳-Ammonium Hydroxide ^۴-Calcium Hydroxide

اقلام خانگی که داری باز هستند :



پودر صابون ، سدیم هیدروکسید (آب قلیایی) ، آمونیاک و ... دارای باز هستند .

نمک ها

چه اتفاقی می افتد زمانی که شما یک اسید را با یک باز و یک باز را با یک اسید خنثی می کنید؟! تم هیدروژن اسید با هیدروکسیل باز به آب تبدیل می شود و اتم فلز بازها با آنچه که از اسید باقی مانده آب نمک را تشکیل می دهنند. برای مثال زمانی که شما سدیم هیدروکسیل را با هیدروکلریک اسید ترکیب می کنید داریم :



نتیجه آن سدیم کلرید یا همان نمک طعام می شود . نمک ها در صنعت استفاده می شوند ؟ سدیم کلرید و سدیم کربنات از مهمترین های این عرصه هستند . تعداد دیگری از مواد شیمیایی از آن ها تولید می شوند . اگر کارخانجات صنعتی ما به اندازه کافی این دو نمک را در اختیار نداشته باشند زندگی ما نیز دارای مشکلات فراوانی خواهد شد . بسیاری دیگر از نمک ها برای خوشی و رفاه ما لازم هستند.

در زندگی روزمره شما در منزل ممکن است از انواع نمک ها در پختن و با غبانی و تمیز کردن استفاده شود. در آزمایش های شیمیایی شما با دو دسته از نمک ها کار می کنید : نمک های معمولی (سدیم کلرید، سدیم کربنات، پتاسیم یدید) که بون هیدروژن یا هیدروکسیل آزاد ندارند و نمک های اسیدی (مانند سدیم هیدروژن سولفید، سدیم هیپوکربنید) که شمال هیدروژن های قابل جایی هستند .

۹

نمک های معمولی:

NaCl , Na_2CO_3 , KI

نمک های اسیدی :

NaHSO_4 , NaHCO_3

تعدادی از این نمک ها به راحتی در آب حل می شوند ؟ تمام نیترات ها (نمک های هیدروکلریک اسید). بعضی از نمک ها هم غیرقابل حل هستند. بیشتر کربنات ها هم (نمک کربنیک اسید) و بیشتر سولفات ها (نمک هیدروسولفیک اسید) در این دسته قرار دارند.

چگونه نام گذاری نمک ها:

HOW THE NAMES OF SALTS ARE MADE UP

THE ACID		FORMULA AND NAME OF ACID		FORMULA AND NAME OF SALT
SULFURIC ACID	H_2SO_4	HYDROGEN SULFATE	Na_2SO_4	SODIUM SULFATE
NITRIC ACID	HNO_3	HYDROGEN NITRATE	NaNO_3	SODIUM NITRATE
CARBONIC ACID	H_2CO_3	HYDROGEN CARBONATE	Na_2CO_3	SODIUM CARBONATE
ACETIC ACID	$\text{HC}_2\text{H}_3\text{O}_2$	HYDROGEN ACETATE	$\text{NaC}_2\text{H}_3\text{O}_2$	SODIUM ACETATE
HYDROCHLORIC ACID	HCl	HYDROGEN CHLORIDE	NaCl	SODIUM CHLORIDE
HYDROSULFURIC ACID	H_2S	HYDROGEN SULFIDE	Na_2S	SODIUM SULFIDE
SULFUROUS ACID	H_2SO_3	HYDROGEN SULFITE	Na_2SO_3	SODIUM SULFITE
NITROUS ACID	HNO_2	HYDROGEN NITRITE	NaNO_2	SODIUM NITRITE
CHLOROUS ACID	HClO_2	HYDROGEN CHLORITE	NaClO_2	SODIUM CHLORITE
REMEMBER: -IC ACIDS FORM -ATE SALTS; HYDRO- -IC ACIDS FORM -IDE SALTS; -OUS ACIDS FORM -ITE SALTS				

راههای متفاوت برای تشکیل نمک ها:

۱- نمک از فلز و اسید ها

نوارهای روی را در داخل لوله آزمایشگاه قرار دهید . هیدروکلریک اسید را داخل لوله برشیزد . روی جای خود را با هیدروژن اسید برای تشکیل نمک جابجا می کند و نمک روی کلرید و کلر می سازد .

۲- نمک از اکسید فلز و اسید

یک قاشق غذاخوری کلسیم اکسید (آهک خام) را در داخل یک لیوان برشید . هیدروکلریک اسید را به آن اضافه کنید و بهم بزنید . آهک در اسید حل می شود و کلسیم کلریک و آب را تشکیل می دهد.

۳- دو نمک از دو نمک دیگر

۱- پنج گرم نمک فرنگی اصل (سولفات دومنیزی) در ۲۰ میلی لیتر آب حل کنید و آن را به جوش آورید.




۲- پنج گرم جوش شیرین را در بیست میلی لیتر آب گرم حل کنید . آن را داخل نمک فرنگی برشید.

۳- ترکیب شیری را از صافی عبور دهید . مایع زیر صافی شامل سدیم سولفات است و منیزیم کربنات، روی صافی باقی مانده است .


۴- نمک از اسید دیگر

قطعنات گچ ، مرمر یا لاک صدف (همه ای این ها دارای کلسیم کربنات هستند) در داخل مقدار کمی هیدروکلریک اسید برشید . نتیجه کلسیم کلرید و کربنات اسید می شود (که در کربن دی اکسید و آب تجزیه می شود) .


زمانی که شما سولفید آهن را از دو عنصر آهن و گوگرد به وجود می آورید در واقع شما یک نمک را درست می کنید .



واکنش فلز روی و هیدروکلریک اسید با یکدیگر ، تشکیل یک نمک است .




زمانی که یک سدیم هیدروکسید را می سازید شما از یک باز و یک نمک برای تشکیل یک باز و یک نمک جدید استفاده می کنید.



یک نمک و یک اسید اغلب با یکدیگر یک نمک و اسید دیگری را می آفرینند.



دو نمک اتحال پذیر ممکن است دو نمک دیگر که یکی از آن ها اتحال ناپذیر است؛ درست کنند.



ید^۱ - بنفسن یا قمهه ای

I

ید: عنصر پنهان و هفتمه جدول با وزن اتمی ۱۲۶.۹۱ است. کریستالی است سیاه و فاکستری با بویی ویژه، به هنگام تبادل به رنگ بنفسن درمی آید، مستقیماً با فلزات و نافلزات ترکیب می شود.

آزمایش با ید بسیار جالب است. ترکیباتش به راحتی از آن آزاد می شود؛ بخاری بنفسن و زیبا که به رنگ سیاه و خاکستری تغییر می کند و می توانید کریستال ها را در حال سرد شدن بینید. به علاوه آن ها می توانند با دوباره تغییر کردن به بخار و دوباره تغییر کردن به فرم کریستالی تصوفیه شوند که به این عمل تصعید^۳ می گویند (تبديل

شدن از حالت گازی به جامد). ممکن است شما با محلول دو درصدی یدهای الكلی شناخته شده با اسم تنتورید^۲ آشنا باشید. در بسیاری از خانه ها می توان آن را در قفسه ی داروها پیدا کرد همچنین از آن برای ضدغوفنی جراحت و زخم ها استفاده می کنند. از ید می توان استفاده های زیادی کرد. در عکاسی در آماده سازی انواع داروها و رنگ ها کاربرد دارد.

^۱-Iodine

^۲- Sublimation


^۳- Tincture of idoine

ساختن ید

- ۱- در یک شیشه پیرکس دو گرم یدید پتاسیم^۱ و دو گرم منگنز دی اکسید^۲ و چهار گرم سدیم بی سولفیت^۳ ترکیب کند و آن را به آرامی گرما دهید . به زودی بخار بنفس رنگی ظاهر می شود . مراقب باشید بخار را تنفس نکنید .
- ۲- شش عدد یخ مکعب شکل کوچک را در یک شیشه دهان گشاد بزیزید . کمی آب به آن اضافه کنید . شیشه را همانند یک سرپوش روی شیشه پیرکس قرار دهید . بخار بنفس رنگ با قسمت پایینی شیشه دهان گشاد برخورد می کند . شما شاهد تشکیل کریستال های یدی سیاه و خاکستری رنگ هستید .
- ۳- شما می توانید این یدها را از انتهای شیشه جمع کنید و آن را در یک بطری کوچک نگه دارید البته در آن را باید محکم ببندید.



یدهای مستقل به وسیله کلر



ابزارهایی که در قسمت ساختن کلر در آزمایشگاه خانگی استفاده شد را دوباره مهیا کنید . در بطری B محلول یک دوم گرمی یدید پتاسیم را در چهل میلی لیتر آب بسازید . زمانی که حباب های کلر تمام شود محلول از ید آزاد قهقهه ای می شود . با کلر بیشتر دوباره پاک می شود این زمانی است که اسید یدیک بی رنگ ، شکل می گیرید .


۱-Potassium Iodide

۲- Manganese Dioxide

۳- Sodium Bisulfate

ید توسط اکسایش^۱ (اکسیداسیون)

مقدار کمی کریستال های پتاسیم یدید و سدیم بی سولفیت را در پانزده میلی لیتر آب حل کنید . هیدروژن پروکسید^۲ را به آن اضافه کنید . تکان دهید . یدهای آزاد به رنگ مایع قهوه ای در می آیند.



برداشتن لکه ید

بک کاغذ را با ید رنگ کنید . مقدار کمی هیپوسولفیت سدیم^۳ را در آب حل کنید . با این محلول روی کاغذ ی که با ید رنگ شده بود (کاغذ قهوه ای رنگ) نقاشی بکشید . در این




حالت شما می بینید که رنگ قهوه ای رنگ به رنگ سفید تبدیل شده در واقع محلول رنگ ید را بی رنگ می کند.

گوگرد و ترکیباتش

در روزگاران قدیم گوگرد کبریت نامیده می شد (سنگی که می سوزد و از لغت قدیم بردن که امروزه برن خوانده می شود - سوختن - گرفته شده است) . با شعله های آبی می سوزد . در قدیم مردم مطمئن بودند که شیطان در اطراف آن است.

S

گوگرد : عنصر شانزدهم با وزن اتمی ۳۶/۰۶۶ ، دارای چگالی ۱۰/۰۷ با کریستال های (زد رنگ) است، غیر قابل حل در آب ، نقطه ذوب ۱۱۹ درجه سانتی گراد، نقطه جوش ۱۴۵ سانتی گراد و در سوختن با هوا دارای شعله های آبی (رنگ) است .



۱-Oxidation

۲- Hydrogen Peroxide

۳- Hypo



بیشتر گوگرد از کوه آتش فشانی جزیره‌ی ایتالیایی سیسیل می‌آمد اما امروزه آمریکا بیشترین تولید گوگرد را در سرتاسر دنیا دارد. حدود صد سال قبل بزرگترین ذخیره گوگرد در لویزیانا^۱ آمریکا زیر چندین فوت خاک پیدا شده بود. مشکل استخراج آن توسط راه حل هوشمندانه‌ی یک مهاجر جوان آلمانی به نام هرمن فرش^۲ در سال ۱۸۹۴ حل شد. او آب بسیار داغ را راهی زیر زمین کرد و گوگرد را ذوب و سپس با هوای متراکم، گوگرد را مجبور به سازی شدن و بیرون آمدن از زمین کرد. خود گوگرد برای بسیاری از اهداف استفاده شد. با جریانی که به آن ولکانیدن^۳ (حرارت زیاد) نامیدند؛ چسبنده‌ی می‌شد و به لاستیک خام و چسبناک برای لاستیک قابل ارجاع و استفاده برای تایر اتومبیل و محصولات لاستیکی دیگر تبدیل می‌شد. همچنین در باروت و آماده سازی و تجهیزات پزشکی از آن استفاده می‌شد اما مهمترین استفاده آن در آماده سازی جوهر گوگرد (سولفیریک اسید)^۴ است. این اسید در تولیدات مستقیم یا غیر مستقیم دخیل است. در

تصفیه کردن گازوئیل، در ساختن فولاد و کاغذ، در فیبر و فیلم، در مواد منفجره و پلاستیک و دیگر محصولات شیمیایی ما شاهد دخالت آن هستیم.

گوگرد را می‌توان در سه فرم متفاوت خریداری کرد: گوگرد چسبی، شمع گوگردی و پودر آن. در زیر میکروسکوپ پودر گوگرد مثل کریستال‌های لوزی شکل ظاهر می‌شوند.

۱-Louisiana

۲- Herman Frasch

۳- Vulcanization

۴-Sulfuric Acid (H_2SO_4)

تولد: ۱۸۵۱ میلادی، مرگ: ۱۹۱۴ می، پاریس

ساختن گوگرد

زمانی که شما گوگرد را ذوب می کنید؛ چهار مرحله را باید پشت سر بگذارید:



۱- نخست آن را ذوب کنید، مایع حصیری رنگ حاصل می شود.

۲- کم کم چون کارامل قهوه ای رنگ می شود.

۳- شروع به جامد شدن می کند.


۴- دوباره مایع می شود و با بخار زرد می جوشد.

ریختن گری با گوگرد

۱- یک قالب از یک نیکل (سکه پنج سنتی) درست

کنید برای این کار اطراف سکه و دور لبه های آن را با نوار چسب پهن بیندید تا یک حصار درست شود.


۲- یک سوم لوله آزمایشگاهی را پر از گوگرد کنید و به آرامی آن را روی شعله ذوب کنید. آن را داخل قالب بریزید. زمانی که سرد شود شما یک قالب و طرح کامل دارید.



گوگرد پلاستیکی

۱- یک دوم پودر گوگرد را در داخل لوله آزمایشگاهی ذوب کنید. همچنان، گرمای دادن به آن را ادامه دهید. به زودی روان می شود. شما با برعکس کردن لوله آزمایش شاهد میزان روان شدن آن هستید.

۲- گوگرد غلیظ شده را دوباره گرما دهید تا میزان سلاست آن بیشتر شود سپس سیال تیره را داخل آب سرد بزدید . آن به یک توده پلاستیکی تبدیل می شود . دوباره در چند روز به گوگرد زرد تبدیل می شود. به تصویر دقت کنید.




ایندریدسولفورو^۱ برای سفید کردن

۱- یک سیم را به یک سر بطری کوچک وصل کنید . نیمی از سر بطری را پر از پودر گوگرد کنید . گوگرد را روشن کنید .

۲- گوگرد در حال سوختن را داخل یک شیشه دهن گشاد فروکنید . شیشه پر از دود (ایندریدسولفورو) می شود .


۳- شیشه‌ی بالای ظرف را بردارید . داخل شیشه را پوست سیب بزدید همچنین گل رنگ روشن و مرطوب را داخل آن بگذارید . دوباره شیشه را روی آن بگذارید . بعد از مدتی مشاهده می کنید گل سفید شده است . مراقب باشید دود منتشر شده در آزمایش را تنفس نکنید .



^۱-Sulfur Dioxide

ایندرید سولفورو (گوگرد دی اکسید)

اولین قدم برای ساختن جوهر گوگرد از گوگرد ، سوزاندن گوگرد است . زمانی که در هوا می سوزد هر اتم گوگرد دو اتم اکسیژن را می گیرد و مولکول گاز ایندرید سولفورو را می سازد .



با یک فرایند خاص و پیچیده گوگرد دی اکسید را
می توان مجبور کرد که یک اتم دیگر اکسیژن را
بگیرد و به گوگرد تریوکسید تبدیل شود . با آب
اسید سولفیریک را می سازد :

$$\text{H}_2\text{O} + \text{SO}_2 \longrightarrow \text{H}_2\text{SO}_4$$


سولفید هیدروژن

بسیاری از ترکیبات گوگرد ، بویی نافذ و نامطبوع
دارند . بعضی از این ترکیبات ، مولکول هایی پیچیده

دارند - فقط تصور کنید که یک راسو یک ماده شیمیایی را با فرمول زیر تولید کند :



همانند بوی تخم مرغ های فاسد است . در دسته دیگر از یک ترکیب ساده ، هیدروژن سولفید می آید . سولفید هیدروژن در آنالیزهای شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرند تا تعیین کنند چه فلزهایی در یک جز مشخص پیدا شده اند . یا فلزهایی در میان نمک ها ترکیب می شوند که می توانند تشخیص داده شوند ؛ از طریق رنگشان یا راهی که آنان با اسیدها یا دیگر مواد شیمیایی واکنش می دهند .



ایندرید سولفورو از یک نمک

یک دوم قاشق چای خوری هیپو^۱ را در ۰ .۴ میلی لیتر آب حل کنید . مقدار
کمی جوهر نمک به آن اضافه کنید . ایندرید سولفورو و گوگرد ته نشین
شده حاصل می شود .

توجه : این آزمایش ها را در خارج از منزل و یا در اتاقی که پنجره هایش باز باشد انجام دهید و مراقب باشید دود و یا بخار آن تنفس نکید .

سولفید هیدروژن :

H_2S

سولفید هیدروژن : ترکیبی با وزن مولکولی ۳۴، گازی بدون رنگ و با بویی مانند تخم مرغ فاسد است، با شحله های آبی برای تشکیل HSO_4^- می سوزد. انحلال پذیری فوبی در آب دارد.


سولفید هیدروژن یکی از ابزار آزمایشگاهی مهم برای آنالیز شیمیایی به شمار می رود . سولفید هیدروژن بویی همانند تخم مرغ فاسد دارد .



۱- داخل یک لوله آزمایشگاهی مرطوب یک چهارم فاشق چای خوری گوگرد و مقدار زیادی موم شمع به طول یک خودکار بربیزید . ابزارها را طوری که در تصویر مشخص است قرار دهید و از آن ها استفاده کنید .


۲- محلول را داخل یک لوله آزمایشگاهی که قصده دارد آنالیز کنید بسازید و لوله آزمایشگاهی شماره یک را به داخل آن هدایت کنید .

۳- لوله آزمایشگاهی با مخلوط گوگرد گرما دهید . سولفید هیدروژن داخل محلول آزمایشی به جوش می آید. اگر شامل نمک یکی از فلزات سنگین باشد ته نشین می شود .



آزمایش هایی با H_2S

- ۱- طبق شکل سر یک لوله آزمایشگاهی را با درپوشی که از وسط آن یک لوله شیشه ای گذشته تهیه کنید. داخل لوله آزمایشگاهی سولفید هیدروژن وجود دارد.
یک سکه نقره ای مرطوب را رو به روی لوله شیشه ای قرار دهید. سکه به رنگ سیاه تغییر می کند.
(البته آنچه در شکل مشخص است باید به لوله گرمابدهید)
- ۲- بعد از چند لحظه لوله شیشه ای که از آن سولفید هیدروژن خارج می شود؛ روشن کنید. سوختن همراه با بوی SO_2 می باشد.
- ۳- یک شیشه ای سرد را در جلوی شعله ای سولفید هیدروژن قرار دهید. به دلیل سوختن ناقص، گوگرد آزاد می شود. شما می توانید با شعله سولفید هیدروژن نقاشی کنید.



سیلیسیم^۱

Si

سیلیسیم: عنصر چهاردهم با وزن اتمی ۲۸/۰۹ است دارای پگانی ۱۴ و به صورت گریستال های فاکستری تیره فلزی مانند یا پودری به رنگ قهوه ای می باشد. در اکسیژن می سوزد . ۲۸ در صدد پوسته زمین را تشکیل می دهد.

سیلیسیم (از اسم لاتین سایلکس به معنی سنگ چخماق گرفته شده است) بعد از اکسیژن دومین عنصر فراوان در زمین است . روی شن یا خاک ، صخره یا سیمان و در کل نصف بیشتر آنچه که شما بر آن قدم می گذارید در واقع سیلیسیم است . سیلیسیم در طبیعت با ترکیب اکسیژن و به طور متفاوت با سیلیکات^۲ پیدا می شود . به استثنای تعداد کمی ، ترکیبات سیلیسیم ها در آب حل


نشدنی هستند و این برای همه مفید است . شیشه پنجره ما و لیوان های شیشه ای که در آن نوشیدنی می نوشیم ، سیلیکاتی هستند همچنین لعای که بر روی فنجان ها و در وان حمام به کار رفته نیز سیلیکاتی هستند . بسیاری از لعاب و شیشه ها با درهم آمیختن ماسه ، سنگ آهک و کربنات سدیم در یکدیگر ساخته شده اند . سیلیکات سدیم و پتاسیم در آب حل می شوند . یک محلول غلیظ سدیم سیلیکات در ذخیره سخت افزار ها با نام واتر گلاس(شیشه مایع) فروخته شده است . از آن به عنوان چسب در چوب نسوز و نگهداشتن تخم مرغ ها استفاده می کنند . در سالهای اخیر شیمی دانان خط ترکیبات جدید سیلیسیم را با نام سیلیکون^۳ گسترش داده اند . بعضی شیشه چربی و نفت ، بعضی شبیه بطانه (اندود آب و آهک) ، بعضی دیگر شبیه لاستیک هستند . با سیلیکون مناسب می توان کاغذ و لباس ضد آب ساخت و تولید کرد .

سنگ های معدنی و گرانبهای

سی درصد صخره ها و چهل درصد ماسه ها دارای سیلیسیم هستند همچنین این آمار ، تعدادی از سنگ ها را شامل می شود .

^۱-Silicon ^۲- Silicates ^۳-Silicones

ساختن اسید سیلیسیک^۱



۱- در یک لیوان ۲۰ میلی لیتر شیشه مایع و ۲۰ میلی لیتر آب بریزید .

۲- در یک لیوان دیگر ۱۰ میلی لیتر هیدروکلریک اسید (جوهر نمک) و ۱۰ میلی لیتر آب بریزید .

۳- هر دو لیوان و ترکیباتش را هم زمان در یک لیوان سوم بریزید .

۴- یک قاشق را در درون آن قرار دهید . تقریباً فوراً ماده تبدیل به ماده لزج می شود و آنقدر سفت می شود که قاشق بدون تکیه کردن به دیواره لیوان در درونش می ایستد و حتی اگر لیوان را بر عکس کنیم مایع که حالا سفت شده است از آن سرازیر نمی شود .

سیلیسیک اسید ضعیف


سیلیسیک اسید بسیار ضعیف تر از کربنیک اسید است که از آن می توان شیشه مایع استخراج کرد . می توان با ریختن هیدروکلریک اسید روی تراشه های مرمر کربن دی اکسید بسازید .



^۱-Silicic Acid


ساختن دی اکسید سیلیکون

مقداری ژل که در آزمایش قبلی نحوه ساختش را یاد گرفتید روی یک بطری فلزی بگذارید و گرما دهید. سیلیسیک اسید (H_2SiO_3) آب را رها می کند و شروع به تبدیل شدن به پودر خاکستری - سفید رنگ دی اکسید سیلیکون می کند .




ساختن شیشه مایع

- ۱- در یک لوله آزمایشگاهی یک گرم سیلیکون دی اکسید که شما قبلا ساخته اید و دو گرم آب قلیایی و NaOH میلی لیتر را با هم مخلوط کنید . لوله را به دقت گرما دهید و نکان .
- ۲- بعد از پالودن آن ، شما یک محلول تمیز سدیم سیلیکات (Na_2SiO_3) خواهید داشت .



ساختن سیلیکات:

- ۱- پنج میلی لیتر شیشه مایع را با پنج میلی لیتر آب رقیق کنید.
- ۲- کریستال های کوچک مس سولفات را داخل آب حل کنید.
- ۳- چند قطره شیشه مایع را برای ته نشینی مس سیلیکات اضافه کنید.



بور^۱، آینده موشك ها، عنصری قوى

B

بور : عنصر پنجم با وزن اتمی ۱۰/۸۲ و پگالی ۵۴/۲ است که به صورت کریستال های قهقهه ای متداول به زرد و پودر قهقهه ای متداول به وجود آمد که به عنوان سوخت، انرژی بور را در اثر حرارت و واکنش با اکسیژن با شعله سبز (زنگ) می سوزد.

کمتر از صد سال پیش ، ماده معدنی ، براکس^۲ نامیده شد که شامل عنصر بور بود که در دره مرگ کالیفرنیا با بیست قطر و تعدادی ارابه (کندترين حمل و نقلی که تصور کنید) بیرون کشیده می شد.

این امکان به وجود آمد که به عنوان سوخت، انرژی بور را برای موشك فضایی قرار دهند - بسیار سریع تراز هر انتقال قابل تصوری! بور همانند کربن این قابلیت را دارد که با هیدروژن ترکیب شود .

^۱-Boron ^۲- Borax

زمانی که این بوران^۱ ها یا بورهیدرید^۲ بسوزد ؛ آنها قدرتی عظیم را ایجاد می کنند. بور می تواند همانند پودر سیاه متمایل به قهوه ای جدا شده باشد. ترکیب کربنش ، بور کاربید^۳ همانند الماس بسیار سخت است . اما شاید شما آشنایی بیشتری با بور داشته باشید . دو نوع از ترکیباتش در وسائل خانگی پیدا شده اند : اسید بوریک^۴ (جوهر بوره) که به عنوان ضدغونی استفاده می شود و برآکس (سدیم تترابورات) که برای تمیز کردن و مانند آب تصفیه کن کاربرد دارد . برآکس بیشترین استفاده را در خارج از خانه دارد که برای لحیم کاری و تولید نوع خاصی صابون و برای ساختن دیگر ترکیبات بور به کار گرفته می شود . صنعت شیشه از برآکس با کیفیت بالا برای تولید شیشه بور - آلمینیم - سیلیکات استفاده می کند . شما این نوع شیشه را با نام تجاری اش پیرکس^۵ می شناسید . شیشه پیرکس آشپزخانه ای و آزمایشگاهی مزیتی بزرگتر از شیشه معمولی دارد . شما می توانید پیرکس را مستقیما روی آتش بگذارید بدون آنکه ترک بردارد و یا بشکند و حتی زمانی که فورا پشت سرهم آن را سرد و گرم کنید به راحتی نمی شکند .

ساختن اسید بوریک


۱- در یک بشقاب فرنی شش گرم برآکس به ۱۵ میلی لیتر آب اضافه کنید . آن را بجوشانید تا برآکس حل شود .

۲- چهار میلی لیتر هیدروکلریک اسید به محلول داغ برآکس اضافه کنید . آن را بجوشانید و تکان دهید . آن را از روی صفحه سیمی بردارید . وقتی که بلور سرد شود بوریک اسید متبلور می شود .

۳- محتویات داخل ظرف را داخل صافی بریزید . زمانی که مایع زیر صافی کامل شد و دیگر چیزی از صافی به پایین ریخته نشد ؛ بوریک اسید باقی مانده در صافی را با آب سرد برای برداشتن سدیم کلرید و فرم دادن به جریان شستشو دهید .

۴- کریستال های بوریک اسید را از فیلتر خارج کنید و اجازه دهید خشک شوند و فقط برای آزمایش ها استفاده کنید .

^۱-Borane ^۲- Boron Hydride ^۳- Boron Carbide ^۴-H₃BO₄ ^۵- Pyrex



آزمایش هایی برای بوریک اسید

تعداد کمی کریستال های بوریک اسید را در ظرف فرنی بریزید . الکل تقلیبی در آن بریزید و آن را آتش بزنید . با یک میله شیشه ای آن را بهم بزنید . بوریک اسید شعله های تیز و سبز رنگ را نمایان می کند.



کاغذ اندیکاتور زردچوبه ای رنگ را با بوریک اسید قهوه ای می شود. رنگ زرد ماده در فهرست خردل زردچوبه ای است. برای ساختن کاغذ آزمایش نوارهای دستمال کاغذی را به خردل آغشته کنید. با شستشو ، خردل را پاک کنید. نوار را خشک کنید.



ساختن بوریک اکسید

اسید بوریک را در یک قاشق قدیمی گرما دهید . آب تولید می کند و به ماده شیرایی بوریک اکسید تبدیل می شود که شما می توانید آن را با یک میله شیشه ای به راحتی بکشید .



سدیم و پتاسیم

برای هزاران سال فروختن سدیم و پتاسیم برای ساختن صابون و شیشه و دیگر اهداف بزرگ رایج بوده است . سدیم کلرید از خانواده سدیم ، مهمترین نمک خوارکی محسوب می شوند که در اقیانوس ها هم ساخته می شوند. گیاهان در اقیانوس ها برای رشد ، سدیم را جذب می کنند. مردم در کنار دریا جلبک دریایی را برای حفظ سودا آش (کربنات سدیم) می سوزانندند. گیاهان در داخل ، پتاسیم را از خاک جذب می کنند. مردم خاکستر چوب را برای

Na
سدیم : عنصر یازدهم جدول با وزن اتمی ۲۶/۹۷ و ۲۲/۰۵۳ گیگالی است ، فلزی سفید (نگ نقره ای که می توان با چاقو آن را برد. در هوا با اکسیژن ترکیب می شود. با آب واکنش می دهد و با شعله های زد (نگ) می سوزد .


بدست آوردن پتاس (پتاسیم کربنات) می جوشانندند. در سال ۱۸۰۷ میلادی یک دانشمند بریتانیایی ، هامفری دیوینی^۱ موفق به تفکیک آهن های پیدا شده در این نمک ها شد. آن ها همانند موم به صورت نرم و نقره فام درآمدند. او این ها را سدیم (از خاکستر سودا) و پتاسیم (از پتاس) نامید . این ها هنوز هم نام انگلیسی شان هستند.

^۱-Humphry Davy

تولد : ۱۷۷۸ میلادی ، انگلیس ، مرگ : ۲۹ می ۱۸۲۹ میلادی

متبلور کردن نمک با تبخیر

- ۱- نوزده گرم نمک خوراکی (NaCl) در ۵۰ میلی لیتر آب داغ حل کنید. محلول را بجوشانید و یک میله شیشه ای که سر آن بسته است آن را بهم بزنید. تا زمانی که نیمی از آب تبخیر شود این کار را ادامه دهید. نمک به شکل کریستال ظاهر می شود.
- ۲- مایع را داخل یک بشتاب بریزید. آن را جلوی پنجره ای که آفتاب از آن عبور می کند برای تبخیر آهسته آب قرار دهید. اینک کریستال ها بیشتر بزرگ و نمایان شده اند.



K

پتاسیم: عنصر نوزدهم با وزن اتمی $39/100$ و با هکالی $87/0$ است، فلزی با رنگ نقره ای سفید، بسیار نزه که با چاقو به راهنمایی بریده می شود. در هوا با اکسیژن ترکیب می شود. با آب واکنش می دهد و با شعله بنفسن (نگ) می سوزد.

پتاسیم:

نیترات به نیتریت

یک دوم قاشق چای خوری نیترات پتاسیم را داخل یک لوله آزمایشگاهی بریزید و گرما دهید تا ذوب شود. داخل لوله را گوگرد به سایز نخود فرنگی بریزید. این تکه ها با شعله آبی و تابان سوخته می شود. مشابه این آزمایش را با تکه های

زغال چوب انجام دهید.

زمانی که پتاسیم نیترات را گرم کنید؛ اکسیژن آزاد می کند و به پتاسیم نیتریت تبدیل می شود.

ساختن پتاس

۱- چند قاشق چای خوری خاکستر چوب که تازه تهیه شده باشد را با کمی آب گرم بهم بزنید. باقی مانده چوب ته نشین می شود.

۲- ترکیب خاکستر و آب را از صافی رد کنید. مواد فیلتر شده را داخل یک بشقاب فنجان مانند جمع آوری کنید. بیشتر آب تبخیر می شود. پس از سرد شدن کریستال های K_2CO_3 نمایان می شود.



Ca

کلسیم: با وزن اتمی ۴۰/۰۸ و
چگالی ۱/۵۱۴ افلزی نقره ای یا
جلایر روشن. با هوای مرطوب
و نمناک واکنش می دهد و به
هیدروکسید تبدیل می شود.

کلسیم برای ساختن

راست بایست. تو این کار را به خوبی انجام می دهی چرا که استخوان هایت را کلسیم فراگرفته است. یک بنا با آجر ساختمان را می سازد. او این کار را با هاون های کلسیمی انجام می دهد. به مرغ بگو برو تخم مرغ بگذار. او به اندازه کافی کلسیم را در غذایش جا می دهد تا بتواند با آن پوسته تخم مرغ را بسازد. کلسیم کربنات

($CaCO_3$) نقطه شروعی برای دیگر ترکیبات کلسیم است که در طبیعت در کوه ها و صخره ها و

در سنگ آهک و سنگ مرمر ... پیدا شده است. برای ماهیچه بدن حیاتی است و میلیون ها موجودات و کائنات ریز دریا را می سازند. کلسیم کربنات تقریبا در آب حل نمی شود. اما اگر آب شامل کربن دی اکسید باشد گاهی اوقات ترکیب می شود و به صورت کلسیم بی کربنات در می آید. این توضیح را می توانیم در ساختار معروف غارهای سنگ آهک را به وضوح بینید. آب باران دارای کربن دی اکسید است که زمانی که به زمین می رسد ؛ نفوذ می کند و مقداری از سنگ آهک را حل می کند. شما می توانید نتیجه این شاهکار را در سقف غارهای مرطوب بینید که قطراتشان H_2O و CO_2 تولید می کنند.

آزمایش سختی آب



۱- یک گرم صابون خرد (رنده شده) را در بیست گرم الکل تقلیبی بریزید و محلولی بسازید و سپس صافی کنید.

۲- لیوان باریک را با نیمی از آب پر کنید . ده قطره از محلول صابون را به آن اضافه کنید. سر آن را بینید و محکم تکان دهید. مقداری از کف را بررسی کنید.

الف: تکان دادن ملایم آب مقدار متوسطی کف می دهد.


ب: تکان دادن شدید آن مقدار بسیار کمی کف ایجاد می کند.

ساختن آب سخت

۱- همانند شکل زیر مولد گاز بسازید . در بطری A هیدروکلریک اسید باشد و در بطری B تراشه های سنگ مرمر بالای سنگریزه ها قرار داشته باشد. برای ساختن CO_2 ، اسید را در بطری B بریزید.

۲- کربن دی اکسید را به داخل محلول کلسیم اکسید هدایت کنید. کاملا به ساختاری شیری مانند CaCO_3 تبدیل می شود.


۳- همچنان به هدایت CO_2 به داخل محلول شیری ادامه دهید. حالت شیری ناپدید می شود. CaCO_3 نامحلول تبدیل به محلول $\text{Ca}(\text{HCO}_3)_2$ می شود.



بیایید دو فلز را با هم مقایسه کنیم

نگاهی به جدول تناوب بیاندازید. شما می‌توانید فلزات منیزیم و روی را پیدا کنید. در ترکیباتشان این دو بسیار شبیه یکدیگر هستند. یک اتم با یک اتم اکسیژن ترکیب می‌شود و اکسید را به وجود می‌آورد (ZnO و MgO). در فرم نمک یک اتم با دو اتم هیدروژن جا به جا می‌شود برای مثال : $ZnCl_2$ و $MgCl_2$) اما در بعضی از واکنش‌هایشان شبیه هم نیستند – به زودی یاد خواهید گرفت . قبل از جنگ جهانی دوم منیزیم بسیار کم مورد استفاده قرار می‌گرفت (عمدتاً در فلاش عکاسی‌ها). با یکدیگر و یا با دیگر فلزات مخلوط می‌شوند و فرم الیاز (فلز مرکب) را تشکیل می‌دهند. تعدادی از ترکیبات منیزیم در پزشکی مورد استفاده قرار می‌گیرند : $(Mg(OH)_2)$ مایع شیری رنگی که هیدرکسید منیزیم است و بعنوان ضد اسید و ملین بکار می‌رود و $(MgSO_4 \cdot 7H_2O)$ سولفات دو منیزی .

واکنش با اسیدها



۱- هر دو فلز با اسید ضعیف واکنش می دهند. حتی با سر که ، منیزیم با سر که سرد و روی با سر که داغ.

۲- محلول یک گرمی سدیم بی سولفات را داخل ۱۰ میلی لیتر آب روی ، روی و منیزیم را بریزید. منیزیم زود واکنش می دهد ولی روی آهسته آهسته . حال روی را با سیم مسی بگیرید. واکنش به دلیل جریان الکتریکی تسريع می یابد.

Mg

منیزیم : عنصر دوازدهم با وزن اتمی ۲۴/۳۲ و چگالی ۱/۷۵ است . فلزی نقره ای - سفید رنگ، مفتول شدنی و چکش خوار است. با آب جوش واکنش من دهد. با شعله های تابان و سفید با هوا من سوزد.

Zn


روی : عنصر سی ام با وزن اتمی ۶۵/۳۸ و چگالی ۷/۱ است . فلزی آبی مایل به سفید، مفتول شدنی و چکش خوار است زمانی که برای جوشیدن گرما من دهیم تغییر من شود.

: H_2S از Mg و Zn

۱- دستگاه سولفید هیدروژن را طبق شکل آماده کنید.

۲- سولفید هیدروژن (H_2S) را با $ZnCl_2$ رقیق کنید. ZnS به رنگ سفید ته نشین می شود.

۳- سولفید هیدروژن را به داخل محلول سولفات دو منیزی ($MgSO_4$) هدایت کنید. این جا رسوب سفید هم به وجود می آید اما نه سولفید منیزیم . این واکنش با آب باعث تشکیل $Mg(OH)_2$ می شود .



آلومینیم :

Al

آلومینیم : عنصر سیزدهم با وزن اتمی ۲۶/۹۸ و پگالی ۲/۷۰ است. فلزی نقره ای سفید رنگ، مفتول شدنی و پکش فوار است. توانایی بالا برای صیقل زدن دارد. دو فصلتی است. با اکسیژن با شعله سفید می سوزد.

این غیر ممکن است که دنیا را بدون آلومینیم در نظر بگیریم. تقریبا هر جایی را که نگاه کنید می توانید شاهد محصولات و اشیایی باشید که از آلومینیم ساخته شده اند؛ از دیگ و ظروف آشپزخانه تا هواپیمایی که روی سر شما پرواز می کند. گرچه این فلز در جهان به فراوانی یافت می شود اما تا سال ۱۸۲۵ هیچ کس آن را ندیده بود. بالاخره دانشمند دانمارکی به نام هانس کریستین اورستد^۱، آن را از آلومینیم کلرايد جدا کرد (AlCl_3). برای چند سال نیز حتی از طلا و نقره گرانتر شده بود. کلاهک جامد آلومینیمی را بالای مائینت و واشینگتون (Washington Monument) قرار دادند و در سال ۱۸۸۴ برای اولین بار آن را در معرض نمایش عمومی قرار دادند تا دیگران این فلز را از نزدیک ببینند.




Washington Monument

^۱-Hans Christian Ørsted

تولد: ۱۷۷۷ میلادی دانمارک، مرگ: ۹ مارس ۱۸۵۱ میلادی

دو سال بعد شیمی دان ۲۲ ساله‌ی آمریکایی به نام چارلز مارتین هال^۱ چگونگی تولید آلومینیم از اکسید آلومینیم را اختراع کرد که بسیار ارزان تر تمام می‌شد. بعد‌ها آلومینیم به دلیل سبک بودنش پکی از فلزات محبوب شناخته شد. مواد معدنی بوکسیت^۲ یکی از منابع اصلی آلومینیم است. آلومینیم را همچنین می‌توان در طبیعت در اکسید و یا در بسیاری از ترکیبات سیلیکاتی یافت. دو چیز در مورد آلومینیم شما را همچون شیمیدان علاقمند می‌کند. اول اینکه یک عنصر آمفوتری^۳ (دو خصلتی) است و دیگر اینکه آلومینیم سولفاتات ($\text{Al}_2(\text{SO}_4)_3$) این توانایی دارد که با پتانسیم سولفاتات (K_2SO_4) و آمونیوم سولفاتات ($(\text{NH}_4)_2\text{SO}_4$) ترکیب شود و کریستال‌ها مکعبی سولفاتات مضاعف آلومینیم و پتانسیم (زاج سفید) را به وجود آورد.

حل کردن آلومینیم



- آلومینیم را به تراشه‌های باریک و کوچک تبدیل کنید. سپس آن را در داخل مقدار کمی اسید هیدروکلریک رقیق بریزید. هیدروژن رها می‌شود و آلومینیم کلراید تشکیل می‌شود.
- تراشه‌های آلومینیم را داخل محلول ۱۰٪ NaOH بریزید. هیدروژن آزاد می‌شود و NaAlO_2 تشکیل می‌شود.

۱-Charles Martin Hall

تولد: ۱۸۶۳ میلادی، اوهاایا، آمریکا، مرگ: ۱۹۱۴ میلادی، فلوریدا

۲- Bauxite ۳- Amphoteric

منگنز - فلز بسیاری از رنگ ها

Mn

منگنز : عنصر بیست و پنجم مجدول
با وزن اتمی 54.914 ± 5 است. فلزی نقره ای -
پهلویانی 14.7 است. فاکسستری (رنگ و کمی مایل به قرمز
و با آب واکنش می دهد .

منگنز به تهابی خودش مورد استفاده قرار
نمی گیرد. مثلا 15 درصد به فولاد اضافه می شود
که این فلز ترکیبی فولاد منگز می گویند. ترکیبات
منگنز رنگ های مختلفی را به دنبال دارند. مانند :
سیاه ، سفید ، قرمز ، قهوه ای ، صورتی ، بنفش و
سبز. در کار با این ترکیبات این امکان وجود دارد
که انگشتان و یا شیشه ای که با آن کار می کنید

به رنگ قهوه ای درآید. شما می توانید این لکه ها را به آسانی با هیدروکلریک اسید رقیق شده پاک
کنید . بعد از اتمام کارتان با آب خوب دستتان را شستشو دهید.

منگنز دی اکسید به منگنز سولفات



۱- در یک ظرف شیشه ای پيركس 2 گرم منگنز دی اکسید را با 6 گرم سدیم بی سولفات و 10 میلی لیتر آب ترکیب کنید . به آرامی آن را حرارت دهید . به دلیل آنکه اکسیژن از آن آزاد می شود شاهد تشکیل حباب های شدید خواهد بود.



۲- بعد از چند دقیقه 30 میلی لیتر آب به آن اضافه کنید . آن را از صافی رد کنید . مواد زیر صافی شامل منگنز سولفات ($MnSO_4$) و سدیم سولفات است.

ما در عصر آهن زندگی می کنیم

Fe

آهن: عنصر بیست و ششم با وزن اتمی ۵۵/۸۶ و پگالی ۷/۸۶ است. فلزی فاکسٹری سفید رنگ، مفتول پذیر و هادی است. با بسیاری از اسیدها واکنش می دهد ، هیدروژن آزاد می کند.

فلز آهن دارای خاصیت ویژه ای به نام مغناطیس است که تحت تاثیر نیرویی به نام خاصیت مغناطیسی قرار گرفته می شوند. شما با وجود مغناطیس است که می توانید راه بروید و به هر چیزی که می خواهید دست بزنید. زمانی که شما از خانه پا بیرون می گذارید و اطراف را به دقت نگاه کنید شگفت زده خواهید شد. آسمان خراش ها ، پل ها ، راه آهن ها و کشتی ها و ماشین ها همه به آهن بستگی دارند. شما برای داشتن این فلز با ارزش باید خود را خیلی خوش اقبال بدانید. در آمریکا معادن زغال سنگ نیز برای تولید آهن مورد استفاده قرار گرفته اند . آهن استخراج شده از معادن (Fe_2O_3) در کوره های بزرگ قرار می گیرند. از هر معدن می تواند ۱۰۰۰ تن آهن و همزمان ۲۰۰۰ تن کانه و ۱۰۰۰ تن زغال سنگ سوخته و ۵۰۰ تن سنگ آهک استخراج کرد. فشار زیاد و دمای بالا باعث ترکیب شدن آن ها می شود. زغال سنگ سوخته با حرارت بسیار می سوزد و به کربن دی اکسید تبدیل می شود. در راستای آن اکسید آهن کاهش پیدا می کند و به آهن متالیک تبدیل می شود. در زبان شیمی این اتفاق می افتد:



آهن تازه ریخته شده هنوز شکننده است چرا که دارای ۵ درصد کربن می باشد. برای تبدیل شدن آن به فولاد باید کربن خارج شود یعنی از ۵ درصد یک و نیم درصد باقی بماند . برای این کار از فرایند بسمر (Bessemer process) یا کوره فولاد سازی دهان باز (open hearth) استفاده


شده است . فولاد نهایی به صورت شمش قالب می شود و برای استفاده به کارخانه ها فرستاده می شوند.

در آزمایش های شیمی بیشترین ترکیبی که مورد استفاده قرار می گیرید سولفات آهن است که زاج سبز^۱ نامیده شده است.

ساختن نمک آهن

۱- هیدروکلریک اسید را روی براده های فولاد برشید. سپس محلول را صافی کنید.

۲- مایع سبز و روشن زیر صافی، دارای کلراید آهن است.



مس - دیروز و امروز



مس : عنصر بیست و نهم جدول
با وزن اتمی $63.5/54$ و پگالی
 $8/97$ است. فلزی نرم با رنگ
مایل به سرخ است . بعد از نقره
بهترین (سانای) برق است.

مس از جمله فلزاتی است که بسیار کم در طبیعت پیدا می شود . دلیل محدود شدن آن استفاده بی رویه از آن برای ساخت ابزارات جنگی و ظروف آشپزخانه و ... در تاریخ است. مشکل اساسی آن نرمی است. البته مسگران این مشکل را حل کردند آنها با ترکیب کردن مس و قلع با یکدیگر (ذوب کردن آنها در هم) آلیاژی ساخته اند که بسیار محکم تر از هر دوی آنهاست.

^۱-Green Vitriol

این الیاژ برای دو هزار سال نامش را در تاریخ به نام عصر برنز ثبت کرد . تعداد بسیاری از ابزارات جنگی از عصر برنز در یونان پیدا شده است و این نشان می دهد که بشر برای سالیان دراز از این آلیاژ استفاده کرده است .

مس تا زمانی که جریان برق را اختراع کردند دارای ارزش بسیار کمی بود. بعد از نقره ، مس بهترین رسانای الکتریکی است. امروزه بیشترین استفاده از مس در عرصه های الکترونیک است (مانند جابه جایی جریان برق).

سولفات مس در آنالیز شیمیایی



۱- مقدار کمی کریستال های مس سولفات را خرد کنید. آن را حرارت دهید و تکان دهید تا زمانی که کاملاً به پودر سفیدی تبدیل شوند.

۲- کمی سولفات مس بی آب و تراکلراید را تکان دهید .

۳- یک قطره آب اضافه کنید و تکان دهید . کریستال های آبی تشکیل می شوند.

جایه جایی مس و آهن :

۱- چند میخ تمیز را در محلول مس سولفات بریزید. برای نیم ساعت آن را ساکن در گوشه ای بگذارید.

۲- حالا میخ ها با مس متالیک روکش شده اند . محلول نیز شامل سولفات آهن است.



نقره^۱ – فلزی باشکوه

Ag

نقره : عنصر چهل و هفتم جدول با وزن اتمی $107/880$ و پگالی $10/514$ است. سفید و ذره و فلزی با جلایی روشن است. به راحتی با پکش هالت می گیرد. بهترین (سانانی) شناخته شده برای جبریان برق است.

نقره به مانند طلا و مس^۲ در طبیعت یافت می شود . برای بشر قبیل از اینکه یاد بگیرد که چگونه فلزات را از کانه هایشان استخراج کند ؛ مشاخته شده بود . نقره خالص نیز همانند مس شکل نرمی دارد . این مشکل ، دلیلی شد تا نقره با مس ترکیب و به الیازی محکم تر تبدیل شود . نقره تمام عیار، الیاز معروفی است که برای جواهرات استفاده می شود که شامل $7/5$ درصد مس و $97/5$ درصد نقره است .

برداشتن لکه از نقره



۱- ته یک فنجان دهان گشاد را کاغذ آلومینیم بگذارید. سکه ای لکه دار (کادر شده) روی فویل (کاغذ آلومینیم) قرار دهید (برای امتحان می توانید سکه را روی شعله قرار دهید تا سیاه شود) .

نصف فنجان را بر از آب کنید . یک چهارم قاشق چای خوری کربنات سدیم اضافه کنید . به آرامی بجوشانید . لکه ناپدید می شود.


۲- شما می توانید از این روش برای پاک کردن لکه از روی اجنباس فلزی استفاده کنید . وسایل نقره ای را برای پاک کردن داخل سینی آلومینیمی قرار دهید .

آب و جوش شیرین (کربنات سدیم) اضافه کنید . به جوش آورید. وسایل دوباره همانند روز اول تمیز می شوند و می درخشند .

^۱-Silver

^۲-Copper

ترکیبات نقره :



۵ گرم نیترات نقره را از فروشگاه مواد شیمیایی یا داروخانه ها بخرید و در ۵۰ میلی لیتر آب حل کنید.

۱- به پنج میلی لیتر محلول نیترات نقره (AgNO_3) محلول هیدروکسید سدیم اضافه کنید . رسوب قهقهه ای تیره رنگی پدید می آید که هیدروکسید نیست بلکه متعلق به اکسید نقره است.

۲- به پنج میلی لیتر نیترات نقره آمونیاک^۱ اضافه کنید . زمانی که آمونیاک بیشتری اضافه کنید رسوب اکسید نقره حل می شود.

۳- به پنج میلی لیتر نیترات نقره محلول (NaCl) اضافه کنید . رسوب پنیر مانند کلراید نقره^۲ (AgCl) تشکیل می شود.

۴- به قسمتی از رسوب کلراید نقره ، آمونیاک اضافه کنید . کلراید نقره حل می شود.

۵- به قسمتی دیگر از کلراید نقره محلول تیوسولفات سدیم اضافه کنید . کلراید نقره حل می شود.

۶- باقی مانده AgCl را رو به روی آفتاب قرار دهید . بعد از مدتی بنفش رنگ می شود (نقره متالیک).

^۱-Ammonia

^۲-Silver Chloride

کربن - عنصر یک میلیون ترکیب

C

کربن : عنصر ششم با وزن اتمی ۱۲/۰۱ است. در طبیعت چون الماس ، گرافیت و زغال سنگ یافت می شود. الماس در اکسیژن می سوزد و زغال سنگ در هوا.

زغال سنگ ، سنگ سیاهی است که می سوزد . در شیمی کربن در تمام موجودات زنده از جمله گیاهان و حیوانات و حتی در جسد آن ها پیدا می شود. در سفیدی شکر و سرخی گل رز و در سبزی سبب و صدها هزار ترکیبات تولید شده در طبیعت و صدها ترکیب ساخته شده در آزمایشگاه وجود دارد .

دود شمع روشن ، کربن خالص را می توان یافت.

زغال سنگی که ما به عنوان سوخت از آن استفاده می کنیم ۸۰ تا ۹۰ درصد دارای کربن هستند و ۲۰ درصد بقیه آن از اجزایی ساخته شده که دارای ارزش فراوان شیمیایی هستند.

زغال سنگی که در زیر زمین وجود دارد؛ بقایای گیاهانی است که سیصد میلیون سال پیش زندگی می کردند. همانند درختان تنومند سرخس ، خزه های بزرگ و آن ها در آب و هوای گرم مرتبط رشد کردند و سپس از بین رفتند و بر زمین افتادند. در طول سال ها لایه هایی از درختان و لایه هایی از گل روی هم انباسته شدند. به صورت مداوم روی هم فشرده شدند و به زغال سنگ تبدیل.

ترکیبات شیمیایی کربن

در شیمی دو قرن پیش ، ترکیبات را به دو گروه آلی^۱ و غیر آلی^۲ تقسیم بندی می کردند. ترکیبات آلی توسط ارگانیسم های زنده تولید می شدند و ترکیبات غیر آلی توسط دیگر مخلوقات غیر زنده تولید می شدند همانند صخره ها ، مواد معدنی ، آب ...

این شیمیدان ها بر تولید ترکیبات آلی مصنوعی پافشاری نمی کردند . آنها لازم می دانستند که مخلوقات زنده را قادر به تولید ترکیبات آلی بدانند.

۱-Organic

۲-Inorganic

در سال ۱۸۲۸ میلادی دانشمند آلمانی فریدریچ ولر کاملاً این نظریه را واژگون کرد. در آزمایشگاه شخصی خود سولفات آمونیم (NH_4SO_4) و سیانات پتاسیم (KCNO) مخلوط کرد و انتظار داشت محصول نهایی سیانات آمونیم باشد. بعد از تبخر ؟ ترکیبی را که ساخته بود آنالیز کرد . شگفت زده شده چرا که ماده که کشف کرده بود سیانات آمونیم نبود بلکه اوره بود - ترکیبی که در کلیه (عضو بدن) موجودات زنده از جمله انسان تولید می شود. اتم های مولکول سیانات آمونیم خودشان را در در مولکول اوره باز چیده بودند. یعنی (NH_4CNO) به (NH_4CO) تبدیل شده بود.


چند سال بعد یک ترکیب آلی دیگر - استیک اسید- به طور مصنوعی ساخته شد. به این ترتیب روند کشفیات ادامه پیدا کرد تا جایی که دانشمندان ترکیبات آلی را در محیط آزمایشگاهی می ساختند که در طبیعت وجود نداشت. امروزه شیمی آلی به عنوان « شیمی ترکیبات کربن » تعریف شده است . این تعریف تقریبی است و صد درصد درست نیست. از بعضی ترکیبات کربن می توان هیدروکربن^۱ ، الکل^۲ ، کربوهیدرات ها^۳ ، استرهای^۴ ، پروتئین^۵ ، اسیدهای کربوکسیلی^۶ ... اشاره کرد.

هیدروکربن ها

شمار عظیمی از هیدروکربن ها از نفت خام می آید. زغال سنگ و گاز طبیعی خود بستری فراهم کرده که بسیاری از مواد دیگر از این ها گرفته شده اند . کائوچو (لاستیک طبیعی) ، ترباتین (سقز) ، کافور و ... این ها نیز توسط طبیعت تولید می شوند. حتی رنگ قرمز گوجه فرنگی و زرد مایل به نارنجی هویچ نیز هیدروکربن هستند. نکته جالب توجه در مورد هیدروکربن ها ، امکان ترکیب شدن شان با مولکول های کوچک تر برای تولید مولکول بزرگتر است (همانند لاستیک مصنوعی) .

شکل زیر چگونگی جز به جز کردن نفت را مطرح می کند.

۱-Hydrocarbon	۲- Alcohol	۳- Carbohydrate	۴- Ester	۵- Protein
۶-Carboxylic Acid				




متان^۱

متان سبک ترین مولکول کربن دار و یکی از مهمترین مولکول های روی زمین است . این هیدروکربن گازی بی رنگ ، بی بو و آتشگیر است.


۱- تکه های زغال سنگ چاق (زغال سنگ معمولی) را با چکش خرد کنید . و یک قیف را پر از آن کنید . قیف را داخل یک شیشه بزرگ قرار دهید .

۲- شیشه را پر از آب کنید . لوله آزمایش پر از آب را بالای قیف قرار دهید . بعد از چند روز لوله پر از متان می شود .



^۱-Methane


نفتالین^۱



نفتالین می تواند توسط تصعید، تصفیه شود. برای اثبات این موضوع ، گلوله های نفتالین را خرد کنید و آن ها را داخل یک فنجان دهان گشان گرما دهید. نخست ذوب می شوند سپس بخار . یک شیشه پر از قطعات یخ را روی آن قرار دهید . نفتالین همانند کریستال های برگ دار، ته آن قرار می گیرد.

کربوهیدرات ها

به طور معمول وقتی در مورد هیدارت(آپوش ها) حرف می زنیم منظورمان مواد شیمیایی است که دارای آب می باشد اما وقتی در مورد کربوهیدرات ها صحبت می کیم مقصود ترکیب آلی است که دارای کربن و هیدروژن است و اکسیژنی که به تناسب بین هیدروژن و اکسیژن موجود می باشد همانند مولکول آب که در اینجا هیدروژن دو برابر اکسیژن است . بنابراین ما در کربوهیدرات ها ۲۲ اتم هیدروژن و ۱۱ اتم اکسیژن و ۱۲ اتم کربن ($C_{12}H_{22}O_{11}$) پیدا می کنیم و البته به شکل های ($C_6H_{12}O_6$) یا ($C_6H_{12}O_6$) نیز تعریف می شوند. کربوهیدرات ها توسط گیاهان و همراه با فرایندی که فتوسنتز^۲ نامیده می شود ؛ تولید می شوند. برگ های سبز گیاهان در معرض نور آفتاب قرار گرفته و کلروفیل^۳ موجود در آن ها با هیدروژن دریافت شده از آب و دی اکسید کربن دریافت شده از هوا ترکیب می شود و اکسیژن آزاد می شود.



کربوهیدرات ها برای انسان ها دارای جایگاه ارزشمندی هستند. آن ها قسمت اعظمی از غذاهای ما را در فرم هایی از قند و نشاسته تشکیل می دهند. دیگر کربوهیدرات سلولز^۴ نام دارد که ما را در بخش پوشак (پنبه و کتان) و حفاظت (چوب) یاری می رساند.

۱-Naphthalene

۲- Photosynthesis

۳- Chlorophyll

۴- Cellulose

بخش عظیمی از شکر ما از نی شکر یا چغندر ($C_{12}H_{22}O_{11}$) تامین می شود . شکر دیگر گلوکز^۱ نام دارد ($C_6H_{12}O_6$) که در میوه های رسیده یافت می شوند . البته فروکتوز^۲ نیز با همین فرمول به عنوان قند میوه شناخته شده است .

طبق فرمول زیر ساکاروز^۳ نیز از فروکتوز و گلوکز تشکیل می شود .



ساکاروز+آب \longleftrightarrow گلوکز و فروکتوز

نشاسته در بسیاری از قسمت های گیاهان توزیع شده است . البته دارای مولکول های درشتی است . سلولز نیز ماده سازنده عمدۀ گیاهان جهان است که دیواره سلولی گیاهان و ساقه و چوب و الیاف را می سازد . ۹۵ درصد کتان نیز سلولز است . کاغذی که ما از آن استفاده می کنیم هم از سلولز تشکیل شده . بیشتر سلولز ها در طبیعت به صورت الیاف و ریون هستند .

درست کردن نشاسته

این یک روش ساده برای گرفتن نشاسته از سیب زمینی است .

۱- دو عدد سیب زمینی را پوست بگیرید و با قسمت مناسب رنده آن ها را رنده کنید .


۲- خمیر سیب زمینی را داخل دو لایه پارچه پنیری قرار دهید . کیسه را گره بزنید و طبق شکل آب ناشی از آن را بگیرید و داخل یک دیگ آب سرازیر کنید دوباره کیسه را فشار دهید تا کاملا آب آن گرفته شود .

۳- اجازه دهید تا نشاسته در دیگ ته نشین شود سپس بیشتر آب آن را بریزید . باقیمانده را برای ته نشینی بیشتر داخل یک بطربی دهان گشاد شیشه ای بریزید .

۴- دوباره پس از ته نشینی آب آن را بریزید و این کار را تا جایی ادامه دهید که از نشاسته آبی باقی نماند . باقیمانده را داخل یک ظرف بریزید و در جای گرمی قرار دهید تا نشاسته خشک شود .



ساکاروز به گلوکز



۱- یک گرم نیشکر را در ۱۰ میلی لیتر آب در یک لوله آزمایشگاهی حل کنید. ده قطره هیدروکلریک اسید اضافه کنید. به آرامی برای چند دقیقه بدون آنکه بجوشد؟ حرارت دهید.

۲- محصول را داخل یک لوله آزمایش دیگر حرارت دهید. چند


میلی لیتر محلول شکر را به آن اضافه کنید. دوباره حرارت دهید. شما رسوب قرمز رنگی دارید در واقع گلوکز تشکیل شده است.

الکل ها

فهرستی از مهمترین گروه های عاملی شناخته شده در ترکیبات آلبوم:

مثال	نام فانواده	نام گروه عاملی
اتanol	الکل	هیدروکسیل
دی متیل اتر	اتر	اتر
استالدهید	آلدهید	آلدهید
استون	کتون	کربونیل
استیک اسید	کربوکسیلیک اسید	کربوکسیل
متیل استات	استر	استر

درخت خانوادگی اتانول در زیر مشاهده می کنید :




متیل الکل - متانول



متنanol را می توان از طریق تقطیر خشک چوب تولید کرد . لوله آزمایشگاه را از یک سوم تراشه های چوب پر کنید . به آن گرمادهید . توسط یک لوله شیشه ای L مانند بخار را به یک لوله آزمایشگاهی دیگر هدایت کنید که در داخل لیوانی از ترکیب آب و بخ قرار گرفته باشد .

اسیدهای کربوکسیل

اسید استیک^۱



سرکه ، اسید استیک رقیق شده است. تعدادی از نمک هایش - استات - می تواند از سرکه ساخته شده باشد.

۱- ۵۰ میلی لیتر سرکه سفید را در داخل فنجان گرم کنید . کلسیم اکسید را تا جایی که راه دارد حل شود اضافه کنید.

۲- محلول را برای جدا کردن کلسیم اکسید حل نشده فیلتر (صفافی) کنید . محلول زیر صافی دارای کلسیم استات است.

۳- سپس آن را تبخیر کنید یادتان باشد این کار را بسیار ادامه ندهید چرا که امکان دارد به کلسیم کربنات و استون تبدیل شود (CH_3COCH_2).

تانیک اسید^۲

تانیک اسید در چای پیدا شده است.

۱- یک چهارم چای خوری چای را در ۵۰ میلی لیتر آب بجوشانید . سپس اجازه دهید بی تحرک در جایی سرد شود .

۲- کریستال های سولفات آهن را در ۵ میلی لیتر آب حل کنید و به آن چای اضافه کنید. شما به زودی رسوب تانیت^۳ آهن را مشاهده خواهید کرد.

^۱-Acetic Acid

^۲- Tannic Acid

^۳- Tannate



تعاریفی که در شیمی استفاده می شود :

- اسید Acid : ترکیبی کووالانسی از هیدروژن که در آب تفکیک شده و یون های H^+ (یا یون های H_2O^+) تولید می کند.

- الیاژ Alloy : ماده ای که توسط ترکیب شدن دو یا چند فلز ساخته می شود.

- آنالیز Analysis : تجزیه کردن ترکیبات به دو یا چند جز دیگر.

- بی آب Anhydrous : از آب آزاد کردن.

- اتم Atom : کوچک ترین ذره یک عنصر که با اتم های سایر عناصر ترکیب می شود و اجسام مختلف را به وجود می آورد.

- باز Base : در سیستم آرنیوس ، ترکیبی است که در آب تفکیک شود و یون های OH^- تولید می کند.

- کاتالیزor Catalyst : ماده ای که بدون مصرف شدن در واکنش شیمیایی ، سرعت آن را افزایش می دهد.

- شیمی Chemistry : علمی که با شناسایی، ترکیب اجزاء و تبدیل های ماده سر و کار دارد.

- ترکیب Compound : جسم خالصی که از یک یا چند عنصر با نسبت های ثابت تشکیل شده و به استفاده از روش های شیمیایی قابل تجزیه به این عناصر است.

کریستال - بلور : جامدی مشکل از آرایه‌ی متقاضن اتم‌ها، یون‌ها یا مولکول‌ها که با الگوی سه بعدی تکرار شده‌اند.

چگالی - Density : جرم در واحد حجم.

تقطیر - Distillation : جداسازی یک محلول مایع به اجزای آن با استفاده از تبخیر و تراکم.

عنصر - Element : جسم خالصی که قابل تبدیل به اجزای ساده‌تر باشد.

تبغیر - Evaporation : فرایندی که در آن یک مایع به گاز تبدیل می‌شود.

آب پوششی - Hydration : فرایندی که در آن مولکول‌های آب به وسیله ذرات ماده‌ی حل شده جذب می‌شوند و آن‌ها را فرا می‌گیرند.

یون - Ion : ذره‌ای مركب از یک اتم یا یک گروه از اتم‌ها که دارای بار الکتریکی باشد.

ماده - Matter : هر چیزی که فضا را اشغال کند و دارای جرم باشد.

فلز - Metal : عنصری که دارای جلا باشد. گرما و الکتریسیته را به خوبی هدایت کند و در اثر کوبیده شدن نشکند. فلزات در سمت چپ خط قطربی پله‌ای در جدول تناوبی قرار دارند.
شبه فلز، نیمه فلز - Metalloid semimetal : عنصری که فلز و نافلز بودن آن مشخص نیست اما خواص هر دو را داراست. این عناصر در نزدیکی خط قطربی پله‌ای در جدول تناوبی قرار دارند.

مخلوط - Mixture : نمونه‌ای از ماده که شامل دو یا چند جسم خالص باشد، ترکیبی ساده از اجزاء نداشته باشد و با روش‌های فیزیکی قابل جداسازی باشد.

فاتح شدن - Neutralization : واکنشی که بین یک اسید و یک باز یا بین اکسیدهای آن رخ می‌دهد.

نافلز - Nonmetal : عنصری که جلا فلزی ندارد و رسانای خوبی برای گرما و الکتریسیته نیست و در حالت جامد شکننده است. نافلزات در سمت راست خط قطربی پله‌ای در جدول تناوبی قرار دارند.

-اکسایش : آن بخش از واکنش اکسایش - کاهش که با حذف الکترون یا با افزایش

جبری عدد اکسایش مشخص می شود.

-رسوب دادن : تشکیل یک ماده انحلال ناپذیر (موسوم به رسوب) در یک

واکنش آب .

-کاهش : آن بخش از واکنش اکسایش - کاهش که با گرفتن الکترون یا با کاهش

جبری عدد اکسایش همراه باشد.

-نمک : ترکیب حاصل از واکنش یک اسید و یک باز شامل کاتیونی از باز و آنیونی از اسید

است.

-ماده حل شده : یکی از اجزای محلول که به مقداری کوچک تر از مقدار حلال

موجود است این ماده را حل شده در حلال در نظر می گیرند.

- محلول : مخلوطی از دو با چند جسم خالص که یکنواخت (همگن) باشد.

-حلال : جزئی از یک محلول که بیشترین مقدار در محلول وجود دارد و حالت فیزیکی

آن را تعیین می کند.

-جسم : یک عنصر یا یک ترکیب . اجسام دارای خواص و ترکیب ثابت اند.

-تصعید : فرایندی که در آن یک جامد بدون گذشتן از حالت مایع مستقیما به

بخار تبدیل می شود.

بزرگانی از شیمی

در این بخش با دانشمندانی آشنا می شویم که نقش به سزاگی در علم شیمی داشته اند. البته لازم به ذکر است که در این بخش از کسانی گفته ایم که علی رغم کار بر جسته شان کمتر از آن ها نام برده شده است.



Scheele, Carl Wilhelm

تولد : ۹ دسامبر ۱۷۴۲

مرگ : ۲۱ می ۱۷۸۶ ، سوئد

شیمی دانی آلمانی - سوئدی که به صورت مستقل اکسیژن ، کلر و منگنز را کشف کرد.

German Swedish chemist who independently discovered oxygen, chlorine, and manganese.



Gerhardt, Charles

تولد: ۲۱ آگوست ۱۸۱۶ استراسبورگ، فرانسه

شیمی دانی فرانسیسی که پیش رو شیمی دان آلمانی ککول^۱ بود و بر روش شیمی آل کارمی
کرد.

French chemist who was an important precursor of the German chemist August Kekule¹ and his structural organic chemistry.



Fischer, Emil


in full Emil Hermann Fischer

تولد: ۹ اکتبر ۱۸۵۲، پروس

مرگ: ۱۵ جولای ۱۹۱۹ میلادی، برلین، آلمان

شیمی دان آلمانی که برنده جایزه نوبل سال ۱۹۰۴ میلادی شد.

German chemist who was awarded the Nobel Prize for Chemistry in recognition of his investigations of the sugar and purine groups of substances.



Michel-Eugène Chevreul

تولد: ۳۱ آگوست ۱۷۸۶ ميلادي، فرانسه

مرگ: ۹ اوريل ۱۸۸۹، پاريس

شيمى دان فرانسیسى است که ساختار چربى میوانى را روشن کرد و تئوري رنگش، تکنولوژى رنگ فرانسه را تمت تأثیر قرار داد.

French chemist who elucidated the chemical composition of animal fats and whose theories of colour influenced the techniques of French painting.




Arrhenius, Svante August

تولد: ۱۹ فوریه ۱۸۵۹ سوئد

مرگ: ۲ اکتبر ۱۹۲۷ میلادی

فیزیکدان و شیمیدان سوئدی که در سال ۱۹۰۳ میلادی جایزه نوبل شیمی را بدست آورد.

Swedish physicist and physical chemist known for his theory of electrolytic dissociation and his model of the greenhouse effect, he was awarded the Nobel Prize for Chemistry



Ziegler, Karl

تولد: ۲۶ نومبر ۱۸۹۸ ميلادي، نيوگااسل آلمان

مرگ: ۱۲ آگوست ۱۹۷۴ ميلادي، آلمان

شيمى دان آلماني که همراه با شيمى دان ايتالياني به نام ناتا^۱ برنده جاييزه نوبل شيمى ۱۹۶۴ شدند.

German chemist who shared the Nobel Prize for Chemistry with the Italian chemist Giulio Natta. Ziegler's research with organometallic compounds made possible industrial production of high-quality polyethylene. Natta used Ziegler's organometallic compounds to make commercially useful polypropylene.



Ostwald, Wilhelm
in full Friedrich Wilhelm Ostwald

تولد: ۲ سپتامبر ۱۸۵۳ میلادی، (روسیه)

مرگ: ۱۴ اوریل ۱۹۳۲، آلمان

شیمی دان (روسیه - آلمانی که برندہ چارز نوبل ۱۹۰۹ میلادی شد).

Russian-German chemist and philosopher who was instrumental in establishing physical chemistry as an acknowledged branch of chemistry. He was awarded the Nobel Prize for Chemistry for his work on catalysis, chemical equilibria, and chemical reaction velocities.



Hodgkin, Dorothy Mary Crowfoot

تولد: ۱۲ می ۱۹۱۰ میلادی، قاهره، مصر

مرگ: ۳۹ مه ۱۹۹۴ میلادی، انگلیس

شیمی دان انگلیسی که برنده جایزه نوبل شیمی در سال ۱۹۶۴ میلادی شد.

English chemist whose determination of the structure of penicillin and vitamin B₁₂ brought her the Nobel Prize for Chemistry.



Hahn, Otto

تولد: ۸ مارس ۱۸۷۹ میلادی، فرانکفورت، آلمان

مرگ: ۲۸ جولای ۱۹۶۸ میلادی، آلمان

شیمی دان آلمانی که در سال ۱۹۴۵ برنده جایزه نوبل شیمی شد

German chemist who, with the radiochemist Fritz Strassmann, is credited with the discovery of nuclear fission. He was awarded the Nobel Prize for Chemistry and shared the Enrico Fermi Award with Strassmann and Lise Meitner.

Periodic table of the elements

* Numbering system adopted by the International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

IUPAC International Union of Pure and Applied Chemistry (IUPAC).

*** Discoveries of elements 112-116 are claimed but not confirmed. Element names and symbols in parentheses are temporarily assigned by IUPAC.

© 2006 Encyclopædia Britannica, Inc.

